



Patientinformation

Bisköldkörtelskintigrafi

OBS! Om du som patient är gravid eller ammar kontakta oss snarast!

Undersökningstid

Totalt cirka 4 timmar.

Syfte

Att lokalisera bisköldkörtlarna.

Förberedelser

Du får äta och dricka som vanligt.

Vissa mediciner ska man avstå inför denna undersökning då de påverkar undersökningsresultatet. Om du tar någon av nedanstående mediciner och läkaren som skrivit remissen inte gett dig några instruktioner om hur du ska ändra din medicinering inför undersökningen ska du kontakta honom/henne.

- Paricalcitol/Zemplar
- Cinacalcet/Mimpara/Parsabiv

Utförande

Vi ger ett radioaktivt läkemedel i en ven i en arm. Efter cirka 15 minuter ska du ligga stilla på rygg under en gammakamera i cirka 25 minuter. Efter cirka 2 timmar gör vi en ny bildtagning. När du ligger under kameran får du inte ha smycken, piercing, hårspännen/snoddar eller kläder som täcker halsregionen.

Särskild hänsyn

Du ska undvika kontakt närmre än 1 meter med barn under 3 år och gravida de närmaste 6 timmarna efter injektion. Du ska även undvika att sova i samma säng som barn under 18 år och gravida första natten efter undersökningen.