



## Patientinformation

# Skintigrafi vid misstänkt Meckels Divertikel, via barnmottagningen

## Undersökningstid

Totalt cirka 2 timmar.

## Syfte

Att undersöka om vi kan hitta en förklaring till barnets magbesvär.

## Utförande

**På barnmottagningen:** Inför undersökningen sätts en tunn plastslang i ett blodkärl som innebär "ett stick i armen". För att detta ska kännas så lite som möjligt får barnet bedövning (salva eller plåster) på huden. Om bedövningsplåster är medskickat sätts ett i varje armveck senast en timme innan ni kommer till barnmottagningen.

**På nuklearmedicin/klinisk fysiologi:** Barnet får ligga under en gammakamera. Vi ger en liten mängd radioaktivt läkemedel i plastslangen. I samband med detta tar vi bilder, då ska barnet ligga stilla i 30 minuter i två omgångar med paus emellan. Det är mycket viktigt att barnet klarar av att ligga stilla, det är ofta en fördel om små barn sover vid bildtagning. Ibland ger vi ett sedativt (lugnande) medel för att få en bra undersökning.

## Förberedelser

Barn yngre än två år får varken äta eller dricka inom 2 timmar före undersökningen.  
Barn två år och äldre får varken äta eller dricka inom 4 timmar före undersökningen.

Försök att anpassa ert barns sovtid så det stämmer in på undersökningstiden, t. ex. sova kortare/väckas tidigare.

Barnet får inte ha gjort en röntgenundersökning inom 4 dagar där barnet druckit kontrast. Ta med en lista på barnets mediciner.

*Vill du veta mer om undersökningen eller radioaktiva läkemedel gå in på:*

[www.1177.se/Vastra-Gotaland/bildundersokningar-och-rontgen](http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/bildundersokningar-och-rontgen)

[www.1177.se/Vastra-Gotaland/fragor-om-radioaktiva-lakemedel](http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/fragor-om-radioaktiva-lakemedel)