



## Patientinformation

# Ansträngningsprovokation – info före besök

### Välkommen till Barn- o ungdomsmottagningen på NÄL

Som du säkert har fått reda på från din läkare så ska du få testa din lungfunktion vid ansträngning. Detta innebär att du kommer att få göra upprepade spirometriker både före och efter hård ansträngning. Vanligtvis innebär ansträngningen att du får springa på löpband. Testet utförs av en sjuksköterska tillsammans med fysioterapeut och tar cirka 1,5 timma.

#### **Förberedelser hemma:**

Du får INTE ta snabbverkande luftrörsvidgande 4 timmar innan undersökningen. Det gäller: Bricanyl, Airomir, Buventol, Ventilastin, Ventoline etcetera.

Har du långtidsverkande luftrörsvidgande eller kombinationspreparat får du INTE ta det 24 timmar innan undersökningen. Detta gäller: Oxis, Servent, Formatrix, Seretid, Symbicort etcetera.

#### **På barnmottagningen:**

Till besöket behöver du ta med egen astmamedicin, lämpliga skor och kläder för träning samt duschhandduk.

Undersökningstid cirka 1,5 timma.

På [www.1177.se](http://www.1177.se) kan man få tips hur barn kan förberedas inför besök i vården