

Barnmorskemottagningar

Patientinformation: GBS under graviditet översatt till persiska

Datum: 2025-06-23

GBS در دوران بارداری

GBS (استرپتوکوک های گروه ب)

استرپتوکوک های گروه ب یک مخفف آن جی بی اس است، باکتری هایی هستند که بطور طبیعی در روده وجود دارند. گاهی اوقات این باکتری ها خود را به واژن یا مجرای ادرار می رسانند و اغلب روی پوست وجود دارند. یک سوم زنان در سنین باروری در آلت تناسلی خود جی بی اس دارند بی آنکه علائمی داشته باشند. از آنجا که وجود این باکتری بسیار شایع است به عنوان یک وضعیت نرمال تلقی می شود و یک بیماری محسوب نمی شود. وجود باکتری هیچ ارتباطی با بهداشت ناحیه تناسلی ندارد و ناشی از شست و شوی ناکافی نیست. این باکتری از فرد دیگری هم سرایت نکرده است و جی بی اس بیماری مقاربتی نیز محسوب نمی شود.

GBS در دوران بارداری

اکثر زنان بارداری که ناقل باکتری جی بی اس هستند، هیچ گونه علائمی ندارند و نوزادشان نیز کاملاً سالم به دنیا می آید. این باکتری در موارد نادر می تواند باعث عفونت مجاری ادرار شود که باعث سوزش هنگام ادرار می شود و نیاز مکرر به دفع ادرار همراه است.

مشاهده مقادیر اندک جی بی اس در ادرار بدون اینکه هیچ گونه علائم عفونت ادراری در ادرار یافت شود امری عادی است. در اینگونه موارد وجود باکتری با آنتی بیوتیک درمان نمی شود. علت این امر آن است که از بین بردن این باکتری ها با آنتی بیوتیک بسیار دشوار است زیرا که آنها معمولاً باز می گردند. درمان های مکرر با آنتی بیوتیک خطر ایجاد مقاومت در باکتری ها را به همراه دارد. (یعنی باکتری ها در مقابل آنتی بیوتیک مقاوم می شوند) همچنین هیچ شواهدی وجود ندارد که درمان با آنتی بیوتیک در صورت وجود باکتری، "کمکی" به سلامت کودک می کند یا از بیمار شدن کودک پیشگیری می کند.

آنتی‌بیوتیک هنگام زایمان

در مواردی که وجود جی‌بی‌اس محرز باشد فقط هنگام زایمان به مادر، آنتی‌بیوتیک داده می‌شود. این دارو (پنیسیلین، و در مواردی که نسبت به پنیسیلین حساسیت/آلرژی وجود داشته باشد آنتی‌بیوتیک دیگری تزریق می‌شود) هر شش ساعت یکبار به صورت داخل‌وریدی در طول روند زایمان تجویز می‌شود. دلیل این روش درمانی این است که جی‌بی‌اس در موارد نادر می‌تواند باعث عفونت در نوزاد شود، که در این صورت ممکن است نوزاد به شدت بیمار شود.

تصور می‌شود باکتری‌ها هنگام زایمان، زمانی که کودک از واژن عبور می‌کند، به کودک منتقل شوند. از اینرو هنگام عمل سزارین با تعیین وقت قبلی آنتی‌بیوتیک داده نمی‌شود، چون کودک قرار نیست از واژن عبور کند.

کودکانی که زودتر از موعد به دنیا بیایند در معرض ریسک بیشتری برای بیمار شدن قرار دارند. از اینرو حتی اگر بروز جی‌بی‌اس طی دوران حاملگی مشاهده نشده باشد نیز به زنانی که زودتر از موعد زایمان می‌کنند آنتی‌بیوتیک داده می‌شود.

زنانی که طی بارداری‌های قبلی خود دچار عوارض شده باشند

زنانی که قبلاً دوران بارداری پیچیده‌ای داشته‌اند و احتمال داده می‌شود که باکتری استرپتوکوک گروه ب (جی‌بی‌اس) در آن نقش داشته باشد، طبق دستورالعمل‌های خاص تحت مراقبت ویژه قرار می‌گیرند. در این موارد ممکن است نیاز به تنظیم نوع مراقبت وجود داشته باشد و گاهی نیز آزمایش‌های بیشتری انجام شود. ماما و پزشک مرکز خدمات درمانی مادران می‌توانند شما را راهنمایی کنند.