

Barnmorskemottagningar

Patientinformation: GBS under graviditet översatt till arabiska

Datum: 2025-06-23

## «GBS» أثناء الحمل

### «GBS» المكورات العقدية نمط ب

إن المكورات العقدية نمط ب، والتي تُعرف اختصاراً بـ «GBS»، هي بكتيريا موجودة طبيعياً في الأمعاء. وقد تنتقل أحياناً إلى المهبل أو الإحليل، كما توجد عادةً على الجلد. تحمل واحدة من كل ثلاث نساء المكورات العقدية في الأعضاء التناسلية، وذلك من دون ظهور أعراض. وبسبب كثرة انتشارها فإنها تعتبر حالة عادية وليس حالة مرضية. لا علاقة لظهور البكتيريا بنظافة الأعضاء التناسلية، ولا يتوقف وجودها على قلة نظافة الشخص. كما لم يتعرض أي شخص للإصابة بعدوى من شخص آخر، وكما أن المكورات العقدية نمط ب ليست من الأمراض المنقولة جنسياً.

### «GBS» أثناء الحمل

لا يبدو على معظم الحوامل اللواتي يحملن المكورات العقدية أي أعراض إطلاقاً، كما أن أطفالهن يولدن سالمين تماماً. قد تسبب البكتيريا في حالات نادرة التهاب المسالك البولية التي تصيب المرء بالحكة عند التبول وتجعله يشعر بحاجة إلى التبول.

إلا أنه من الشائع العثور على معدلات منخفضة من المكورات العقدية في البول بدون ظهور أعراض التهاب المسالك البولية. ولا تُعالج البكتيريا في هذه الحالة بالمضادات الحيوية. وذلك لأنه من الصعب جداً مكافحة البكتيريا بالمضادات الحيوية لأنها تعود غالباً. إن العلاج المتكرر بالمضادات الحيوية يسبب تعزيز مقاومة البكتيريا (أي أنها تصبح أشد مقاومة للمضادات الحيوية). كما أنه لا توجد أدلة على أن العلاج بالمضادات الحيوية في حالة وجود البكتيريا "يفيد" أو يقي الطفل من المرض.

### المضادات الحيوية عند الولادة

تُعطى المضادات الحيوية عند التأكد من وجود المكورات العقدية فقط للأمهات عند الولادة. ويُعطى الدواء (البنسلين، أو مضاد حيوي آخر إن كان الشخص يتحسس من البنسلين) عن طريق الوريد كل ست ساعات أثناء الولادة. إن سبب العلاج بهذه الطريقة هو أن المكورات العقدية قد تنتسب في حالات نادرة بالتهاب لدى الطفل، مما يجعله مريضاً. حيث يمكن أن تنتقل البكتيريا للطفل عند الولادة عندما يمر الطفل من خلال المهبل. ولذلك لا تُعطى المضادات الحيوية في حالة الولادة القيصرية، لأن الطفل وقتها لا يمر من خلال المهبل.

كما أن الأطفال المولودين باكراً هم أكثر عرضة للمرض. لذلك من الشائع إعطاء المضادات الحيوية للنساء اللواتي يلدن باكراً، حتى لو لم يحملن المكورات العقدية أثناء الحمل.

## النساء اللواتي أصبن بمضاعفات أثناء مرات الحمل السابقة

إن النساء اللواتي مررن بحالات حمل معقدة في الماضي، واللواتي يشتبه بأن المكورات العنقودية قد أسهمت في ذلك، يُعاملن حسب إجراءات خاصة. في هذه الحالة، قد يكون من الضروري تكييف الرعاية، أحياناً من خلال أخذ عينات أوسع. بإمكان قابلك وطبيب مركز رعاية الأمهات تقديم المشورة لك.