

Barnmorskemottagningar

Patientinformation: GBS under graviditet översatt till thailändska

Datum: 2025-06-23

เชื้อจีบีเอสในระหว่างการตั้งครรภ์

จีบีเอส (เชื้อสเตรปโตคอคคัส กรุ๊ปบี)

เชื้อสเตรปโตคอคคัส กรุ๊ปบี ซึ่งชื่อย่อคือ จีบีเอส เป็นเชื้อแบคทีเรียซึ่งในธรรมชาติแล้วมีอยู่ในลำไส้

เชื่อดังกล่าวนี้สามารถผ่านเข้าทางช่องคลอดหรือท่อทางเดินปัสสาวะได้และพบบ่อยครั้งตามผิวหนัง

หนึ่งในสามของผู้หญิงที่อยู่ระหว่างวัยเจริญพันธุ์

เป็นพาหะโรคของเชื้อจีบีเอสในอวัยวะสืบพันธุ์โดยที่ไม่แสดงอาการ

ปกติแล้วเชื้อนี้มีอยู่ทั่วไปจึงนับว่าเป็นเรื่องธรรมดาและมีใช่เป็นอาการของโรค

เชื้อแบคทีเรียดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพของอวัยวะสืบพันธุ์และไม่เกี่ยวกับการดูแลทำความสะอาด

อาตบบริเวณดังกล่าวว่าน้อยเกินไป พร้อมกับไม่สามารถที่จะติดจากคนอื่นได้เช่นกัน

และจีบีเอสยังไม่นับว่าเป็นโรคทางเพศอีกด้วย

จีบีเอสในระหว่างการตั้งครรภ์

ส่วนมากหญิงตั้งครรภ์ที่มีเชื้อจีบีเอสก็ไม่แสดงอาการใดๆและเด็กที่เกิดมานั้นมีสุขภาพสมบูรณ์

มีในบางกรณีที่เชื้อแบคทีเรียสามารถก่อเกิดการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ

จึงทำให้มีอาการแสบขัดเวลาปัสสาวะและมีผลให้ปัสสาวะบ่อย



VÄSTRA
GÖTALANDSREGIONEN

ปรกติแล้วสามารถตรวจเจอเชื้อจีบีเอสในระดับที่ต่ำได้ในน้ำปัสสาวะ

โดยที่ไม่แสดงอาการของการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ

กรณีนี้ไม่มีการรักษาเมื่อตรวจเจอเชื้อแบคทีเรียด้วยยาปฏิชีวนะ

มันเป็นการยากมากที่จะทำให้ลายเชื้อแบคทีเรียด้วยยาปฏิชีวนะเพราะเชื้อมันจะกลับมีขึ้นมาใหม่

ในเวลาที่ยาว การรักษาด้วยยาปฏิชีวนะซ้ำ

หลายครั้งเป็นการเสี่ยงให้เกิดความต้านทานของเชื้อแบคทีเรีย (ตกอยู่สภาวะดื้อยาต่อยาปฏิชีวนะ)

นอกจากนี้ยังไม่มีหลักฐานว่าการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะเวลาที่ติดเชื้อแบคทีเรียว่า

"ช่วย"หรือป้องกันโรคให้กับเด็ก

ยาปฏิชีวนะในระหว่างการคลอดบุตร

จากการสังเกตการณ์ผู้เป็นพาหะโรคของเชื้อจีบีเอ

จึงได้เลือกที่ใช้ยาปฏิชีวนะกับมารดาในระหว่างการคลอดบุตร ด้วยตัวดังกล่าว (เพนนิซิลิน

ในกรณีที่แพ้ยาเพนนิซิลินแนะนำให้ใช้ยาปฏิชีวนะตัวอื่น)

ถูกฉีดเข้าหลอดเลือดดำทุกๆหกชั่วโมงในระหว่างการคลอด สาเหตุที่เลือกการรักษาด้วยวิธีดังกล่าว

เนื่องจากเชื้อจีบีเอสในบางกรณีนั้นทำให้ทารกติดเชื้อและป่วยอย่างรุนแรง

การติดเชื้อแบคทีเรียสู่ทารกในระหว่างการคลอดนั้น เกิดขึ้นเมื่อทารกนั้นคลอดผ่านทางช่องคลอด

จากเหตุผลดังกล่าวจึงไม่มีการให้ยาปฏิชีวนะในกรณีที่วางแผนคลอดเนื่องจากทารกเองไม่ได้ออกมา

นทางช่องคลอด

ทารกที่คลอดก่อนกำหนดเสี่ยงต่อการป่วยสูง

ในกรณีนี้เป็นธรรมดาที่จะให้ยาปฏิชีวนะกับมารดาที่คลอดบุตรก่อนกำหนด

ถึงแม้ว่าจะไม่มีการตรวจเจอเชื้อจีบีเอสในขณะที่ตั้งครรภ์เลยก็ตาม

สตรีที่เคยมีประวัติกับภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ครั้ง ก่อน

สตรีที่เคยมีภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ครั้งก่อนแล้วมีการตั้งข้อสันนิษฐานว่ามีมูลจากเชื้อจีบีเอส

จำเป็นต้องตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน

ซึ่งอาจมีการปรับการดูแลให้เหมาะสมและบางกรณีเก็บผลเพาะเชื้อ

ผดุงครรภ์และแพทย์ประจำศูนย์สุขภาพสตรีสามารถให้คำแนะนำกับคุณได้