

Barnmorskemottagningar, Regionhälsan

Patientinformation: ASA (acetylsalicylsyra) – förebyggande behandling under graviditet översatt till arabiska.

Datum: 2025-02-10

مقدمات الارتعاج (تسمم الحمل) يعني ارتفاع ضغط الدم ووجود البروتين في البول. تصاب 2-8% من كل النساء الحوامل بعوارض مقدمات الارتعاج ويمكن أن يعني ذلك مضاعفات خطيرة خلال الحمل. إعاقة في نمو الجنين هو من العوارض تصاحب أحيانا مقدمات الارتعاج ولكن يمكن أن يحدث ذلك بصورة فردية.

يعود سبب مقدمات الارتعاج والإعاقة في نمو الجنين إلى اضطرابات تصيب المشيمة.

أظهر عدد كبير من الأبحاث أن إعطاء جرعات بسيطة من حمض الأسيتيل ساليسيليك (ASA) acetylsalicylsyra للنساء اللواتي تشملهن مجموعة الخطر يمكن أن يحسن فعاليات المشيمة ويقلل خطر وقوع كل من مقدمات الارتعاج والإعاقة في نمو الجنين. إن المعالجة بحمض الأسيتيل ساليسيليك لا يتضمن أي مخاطر كبيرة على المرأة الحامل أو الجنين.

لذلك توصى المرأة التي يقيّم أنها تواجه خطرا متزايدا لتطور مقدمات الارتعاج لديها/ الإعاقة في نمو الجنين بتعاطي جرعات منخفضة من حمض الأسيتيل ساليسيليك (ASA 75 ملليغرام) في الليل.

ملاحظة! لقد تبين أن التأثير الوقائي يكون أفضل عند تعاطي الجرعة في الليل. يمكن شراء الدواء في الصيدلية بوصفة طبية تحصلين عليها من الطبيب في عيادة القابلة.

تبدأ المعالجة في أسبوع الحمل 10-12 ويجب أن تستمر حتى أسبوع الحمل 36 + 0.

بالنسبة للمرأة التي تعاني من حساسية مفرطة ضد حمض الأسيتيل ساليسيليك أو أي أدوية أخرى تعيق الالتهابات فلا يجب أن تتعاطي هذه المعالجة الوقائية. إذا كنت تعانين من قرحة في المعدة، أو مرض النزاف أو قلة الصفائح الدموية فيجب عليك أيضا الامتناع عن المعالجة باستخدام الترومبيل.

إذا كنت قد تعرضت خلال مرات الحمل السابقة لعوارض مقدمات الارتعاج و/أو إعاقة في نمو الجنين فسيقوم الطبيب المسؤول في عيادة القابلة التي تتبعين إليها بعمل تقييم إذا كان سيعرض عليك إجراءات أخرى خلال فترة الحمل.