

Barnmorskemottagningar, Regionhälsan

Patientinformation: ASA (acetylsalicylsyra) – förebyggande behandling under graviditet översatt till persiska.

Datum: 2025-02-10

پریکلامپسی (مسمومیت بارداری) عبارت از فشار خون بالا و وجود پروتئین در ادرار است. بین 2 تا 8 درصد همه زنان باردار دچار پریکلامپسی می شوند که می تواند عوارض شدیدی طی دوران بارداری ایجاد کند. گاهی اوقات کاهش رشد جنین (IUGR) به پریکلامپسی ارتباط دارد ولی ممکن است جداگانه نیز بروز کند. پریکلامپسی و کاهش رشد جنین بخاطر کم کاری جفت جنین بروز می کنند.

چندین پژوهش علمی نشان داده است که تجویز مقدار کم اسید استیل سالیسیلیک (ASA) برای زنانی که در گروه ریسک قرار دارند می تواند باعث بهتر شدن کارکرد جفت جنین شده و خطر پریکلامپسی و کاهش رشد جنین کمتر کند. درمان با آ.اس.آ برای زن باردار و فرزند آینده او هیچ خطری ندارد.

از اینرو برای افرادی که تشخیص داده شود که ریسک بروز پریکلامپسی یا کاهش رشد جنین در آنان بالاست توصیه می شود مقدار کمی آ.اس.آ (ترومبیل 75 میلیگرمی) شب هنگام استفاده کنند. توجه: مشخص شده است که بهترین تأثیر پیشگیرانه در مصرف شب هنگام بروز می کند. این دارو را با دریافت نسخه از پزشک درمانگاه مادران از داروخانه خریداری می کنید. درمان از هفته 10-12 بارداری شروع می شود و باید تا هفته 36+0 بارداری ادامه پیدا کند.

افرادی که نسبت به آ.اس.آ یا سایر مواد جلوگیری از التهاب (NSAID) حساسیت دارند نباید تحت این درمان پیشگیرانه قرار بگیرند. اگر زخم معده، هموفیلی (بیماری انعقاد خون) یا کمبود پلاکت های خون (ترومبوسیتوپنی) دارید نیز بایستی از درمان با ترومبیل خودداری کنید.

اگر حاملگی های قبلی شما دچار مشکل پریکلامپسی و کاهش رشد جنین بوده باشند دکتر مسئول درمانگاه مادران تشخیص خواهد داد که آیا برای شما اقدامات دیگری طی دوران بارداری بایستی انجام شود یا نه.