

Barnmorskemottagningar, Regionhälsan

Patientinformation: ASA (acetylsalicylsyra) – förebyggande behandling under graviditet översatt till thai.

Datum: 2025-02-10

ข้อมูลสำหรับคนไข้

แอสไพริน (Acetylsalicylic acid=ASA) – การรักษาเชิงป้องกันในระหว่างตั้งครรภ์

ภาวะครรภ์เป็นพิษหมายถึงภาวะที่มีความดันโลหิตสูงและมีโปรตีนหรือไข่ขาวในปัสสาวะ

ภาวะครรภ์เป็นพิษนี้พบได้ 2-8% ของหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด

และสามารถเป็นอาการแทรกซ้อนที่รุนแรงในระหว่างการตั้งครรภ์

การเจริญเติบโตช้าของทารกในครรภ์ (ภาวะทารกโตช้าในครรภ์, IUGR=Intrauterine Growth Retardation)

บางครั้งสัมพันธ์กับภาวะครรภ์เป็นพิษ แต่อาจเกิดขึ้นเองก็ได้

ภาวะครรภ์เป็นพิษและการเจริญเติบโตช้าของทารกในครรภ์เกิดจากความบกพร่องในการทำหน้าที่ของรก

การศึกษาหลายรายได้แสดงให้เห็นว่า การให้แอสไพริน(ASA) ในขนาดต่ำ ๆ ในกลุ่มผู้หญิงที่มีความเสี่ยง

สามารถช่วยให้รกทำงานได้ดีขึ้น รวมทั้งช่วยลดความเสี่ยงทั้งของภาวะครรภ์เป็นพิษ

และภาวะทารกโตช้าในครรภ์ด้วย

การรักษาด้วยแอสไพรินไม่ทำให้เกิดความเสี่ยงที่รุนแรงต่อหญิงมีครรภ์หรือทารกในครรภ์

หากประเมินแล้วว่าท่านมีความเสี่ยงสูงขึ้นต่อภาวะครรภ์เป็นพิษ/ภาวะทารกโตช้าในครรภ์

ท่านจะได้รับการแนะนำให้รับประทานแอสไพรินขนาดต่ำ ๆ (75 มิลลิกรัม) ก่อนนอน

ข้อสังเกต: มีการบ่งชี้ว่าประสิทธิภาพในการป้องกันจะออกฤทธิ์ดีที่สุดถ้ารับประทานยาก่อนนอนเท่านั้น

ยานี้จะซื้อได้จากร้านขายยาตามใบสั่งแพทย์ที่ท่านได้รับจากแพทย์ที่คลินิกพยาบาลผดุงครรภ์

การรักษาด้วยแอสไพรินนี้ จะเริ่มต้นที่เมื่อทราบว่ามีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น ไปจนกระทั่งถึงการตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 37

(หรือจนถึงสัปดาห์ที่ 36+6)

ท่านที่แพ้ยาแอสไพริน หรือยาต้านการอักเสบ (NSAID=Non steroidal anti-inflammatory drug -

ยาต้านการอักเสบที่ไม่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์) จะไม่ได้รับการรักษาเชิงป้องกันด้วยยานี้

ถ้าหากท่านมีแผลในกระเพาะอาหาร โรคเลือดไหลไม่หยุดหรือมีเกล็ดเลือดต่ำ
ท่านก็ควรละเว้นจากการรักษาด้วยยา นี้เช่นกัน

ถ้าการตั้งครรภ์ก่อนๆของท่าน เคยมีอาการแทรกซ้อนของครรภ์เป็นพิษ และ/หรือมีภาวะทารกโตช้าในครรภ์
แพทย์ผู้รับผิดชอบที่คลินิกพยาบาลผดุงครรภ์ของท่าน จะเป็นผู้ตัดสินใจในกรณีที่จะต้องเพิ่มมาตรการ
ให้การดูแลรักษาในระหว่างการตั้งครรภ์