

Ungdomsmottagningen, Telefonnummer:

Till Dig som behandlas med T. Doxyferm/Doxycyklin 100 mg x 14

När du har klamydia får du inte riskera att smitta någon. **Säkrast är att inte ha samlag eller annan typ av sex i 10 dagar efter att du börjat ta antibiotikatabletterna.** Om du ändå har sex, måste du berätta för den personen att du har klamydia och ni måste använda skydd (kondom).

Du skall äta medicinen enligt följande:

En tablett två gånger dagligen i 7 dagar, tas i samband med måltid

- Drick rikligt när du tar dina tablett och gärna ihop med mat för att minska illamående
- Tag inte Järn- eller magkatarrmedicin tillsammans med T. Doxyferm
- Undvik sol/solarie under tiden du äter medicinen och tre dagar efter avslutad kur
- Drick inte alkohol under tiden du tar din medicin
- Kontakta läkare om du får hudutslag eller långvarig diarré

✂.....✂

Ungdomsmottagningen Telefon:

Till Dig som behandlas med T. Doxyferm/Doxycyklin 100 mg x 14

När du har klamydia får du inte riskera att smitta någon. **Säkrast är att inte ha samlag eller annan typ av sex i 10 dagar efter att du börjat ta antibiotikatabletterna.** Om du ändå har sex, måste du berätta för den personen att du har klamydia och ni måste använda skydd (kondom).

Du skall äta medicinen enligt följande:

En tablett två gånger dagligen i 7 dagar, tas i samband med måltid

- Drick rikligt när du tar dina tablett och gärna ihop med mat för att minska illamående
- Tag inte Järn- eller magkatarrmedicin tillsammans med T. Doxyferm
- Undvik sol/solarie under tiden du äter medicinen och tre dagar efter avslutad kur
- Drick inte alkohol under tiden du tar din medicin
- Kontakta läkare om du får hudutslag eller långvarig diarré