

Information till dig som ska ta Cytotec inför spiralinsättning

Varför Cytotec?

Cytotec (misoprostol) används ibland inför spiralinsättning för att mjuka upp livmodertappen (cervix). Det kan underlätta själva insättningen.

Hur och när ska Cytotec tas?

- **Dosering:** 2 tabletter Cytotec 0,2 mg
- **Tidpunkt:** Tabletterna tas **vanligtvis 3–4 timmar före insättning**, enligt instruktion från din barnmorska eller läkare.
- **Administrering:** Tabletterna förs in **vaginalt**
- **Toalettbesök:** Undvik att gå på toaletten direkt efter att du fört in tabletterna, så att de hinner verka.

Viktigt att tänka på

- **Graviditet måste vara utesluten** innan du tar Cytotec. Du kan behöva göra ett graviditetstest om det finns osäkerhet.
- Informera vårdpersonalen om du har **astma, hjärtsjukdom, allergier** eller tidigare haft **kejsarsnitt eller livmodersoperationer**.

Vanliga biverkningar

Cytotec kan ge vissa biverkningar vilka är övergående:

- Mensliknande **smärta eller kramper**
- **Blödning** eller brunaktig flytning
- **Illamående**, diarré eller lätt feber. Du kan ta receptfria smärtstillande läkemedel (t.ex. ibuprofen eller paracetamol) vid behov.