

C. Utfall I frågeformlär Modified Checklist for Autism in Toddlers (M-CHAT – R/F) (© 2009 Robins, Fein, & Barton)

Om förälder angett utfall i minst 3 frågor, ta fram uppföljningsintervjun och bekräfta eventuellt utfall.

Skattningsalgoritm M-CHAT R/F

För alla **frågor** utom 2, 5 och 12 indikerar svaret "NEJ" risk för ASD; för **frågor** 2, 5 och 12 indikerar "JA" risk för ASD. Följande algoritm maximerar M-CHAT-R-formulärets psykometriska egenskaper:

- LÅGRISK:** Total poäng på 0-2; om barnet är yngre än 24 månader, screena igen efter att han/hon fyllt två år. Ingen ytterligare åtgärd nödvändig såvida inte annan utvecklingskontroll indikerar risk för ASD.
- MEDELRIK:** Total poäng på 3-7; Gör uppföljningen (andra steget av M-CHAT-R/F) för att få ytterligare information om risk-indikerande svar. Om M-CHAT-R/F-poängen ligger kvar på 2 eller högre har barnet screenat positivt. Nödvändig åtgärd: remittera barnet för diagnostisk utredning och bedömning av huruvida han/hon har behov av tidiga insatser. Om poängen på uppföljningen är 0-1 har barnet screenat negativt. Ingen ytterligare åtgärd nödvändig såvida inte annan utvecklingskontroll indikerar risk för ASD. Barnet bör screenas igen vid framtida besök på barnavårdscentral.
- HÖGRISK:** Total poäng på 8-20; Det är acceptabelt att förbigå uppföljningen och remittera omedelbart för diagnostisk utredning och bedömning av huruvida barnet är kandidat för tidiga insatser.