

Lokal utbildningsdag MHV 7, 8 & 16 november

STI



Kunskapscentrum för sexuell hälsa arbetar för allas rätt till bästa möjliga sexuella och reproduktiva hälsa - på lika villkor genom hela livet.


Den sexuella och reproduktiva hälsan är viktiga delar av den allmänna hälsan. Därför behöver vi inom hälso- och sjukvården prata mer om sexualitet och göra det till en självklar del av vårt arbete.

Som kunskapscentrum stöttar och samverkar vi med verksamheter i SRHR-arbetet genom verksamhetsutveckling, utbildning och forskning.



Utbildning: Sexuell hälsa i Primärvården- fokus på hiv/ STI (vgregion.se)

Sexuell hälsa i Primärvården- fokus på hiv/ STI

- ▶ Deltagare
-  Betyg
- ▶ Utbildningsinformation och utbildningsplan
- ▶ Välkommen
- ▶ SRHR och Mänskliga Rättigheter
- ▶ STI, när ska vi tänka på det?
- ▶ STI, hur gör vi?
- ▶ Smittspårning
- ▶ Utvärdering
- ▶ Kursintyg

- ▶ Deltagare
- 📄 Betyg
- ▶ Utbildningsinformation och utbildningsplan
- ▶ Välkommen
- ▶ SRHR och Mänskliga Rättigheter
- ▶ STI, när ska vi tänka på det?
- ▼ STI, hur gör vi?
 - 📄 STI-provtagning
 - 📄 **Instruktioner för STI-provtagning**
 - 📄 Prata säkrare sex och kondom
 - 📄 Smittskyddslagen
 - 📄 Vårdgivare vid hiv/STI provtagning
 - 📄 Fördjupning
- ▶ Smittspårning
- ▶ Utvärdering
- ▶ Kursintyg

Sexuell hälsa i Primärvården- fokus på hiv/ STI ☰

- ▶ Deltagare
- 📄 Betyg
- ▶ Utbildningsinformation och utbildningsplan
- ▶ Välkommen
- ▶ SRHR och Mänskliga Rättigheter
- ▶ STI, när ska vi tänka på det?
- ▼ STI, hur gör vi?
 - 📄 STI-provtagning
 - 📄 Instruktioner för STI-provtagning
 - 📄 **Prata säkrare sex och kondom**
 - 📄 Smittskyddslagen
 - 📄 Vårdgivare vid hiv/STI provtagning
 - 📄 Fördjupning
- ▶ Smittspårning
- ▶ Utvärdering
- ▶ Kursintyg

Sexuell hälsa i Primärvården- fokus på hiv/ STI ☰

- ▶ Deltagare
- 📄 Betyg
- ▶ Utbildningsinformation och utbildningsplan
- ▶ Välkommen
- ▶ SRHR och Mänskliga Rättigheter
- ▶ STI, när ska vi tänka på det?
- ▶ STI, hur gör vi?
- ▼ Smittspårning
 - 📄 Smittskyddsblad
 - 📄 Smittspårning
 - 📄 Dokumentation vid smittspårning
 - 📄 **Flödesschema vid smittspårning**
 - 📄 Smittspårningssamtal
 - 📄 Smittspårningshandlingar
- ▶ Utvärdering
- ▶ Kursintyg

[#54 Könssjukdomar | Sex på arbetstid \(podbean.com\)](#)

[#42 Säkrare sex | Sex på arbetstid \(podbean.com\)](#)

[#44 PrEP | Sex på arbetstid \(podbean.com\)](#)



Provtagningsmall STI

NOVEMBER 2022

STI	Klamydia	Gonorré	Hepatit B	Hepatit C	Hiv	Syfilis	Mycoplasma G	Kondylom	Herpes	Kommentar
Tidigaste tid för provtagning efter smittotillfälle. (Tidigare om symtom.)	7 dagar		2 mån och omprov vid 6 mån för säkert resultat.		* 2 v • Omprov vid 6 v • Hivtest med snabb svar 8 v	2 v och omprov vid 3 mån* för säkert resultat.	10 dagar			
Urinvägsbesvär	●				Hivtest erbjuds frikostigt till alla					Ev. urinodling
Flytningar	●									
Mellanblödningar	●									
Blödning i samband med samlag	●									
Ont nedtill i buken/underlivet/pungen	●									
Sår, utslag, blåsor, klåda eller smärta i underlivet/anus/oralt	●						● Syfllissår kan även förekomma oralt	Klinisk bild avgör	Klinisk bild avgör	Finns misstanke om apkoppor kontakta Hud/ STI/ Könsmottagning eller infektionsmottagning.
Svullna lymfkörtlar	●									
Ögonbesvär/ ensidig konjunktivit	●									Prov tas från konjunktiva, ev. till ögonläkare
Längdragna halsbesvär efter oralsex	●									Tag svalgprov klamydia/gc.
Har inom de senaste 12 månaderna haft vaginalt, oralt, analt sex med ny eller tillfällig partner	●		●	●			●			Tag prov vaginalt, i svalg, rektalt, urogenitalt utifrån sexuell praktik. För svalgprov, se ovan.
Har haft sex utomlands	●		●	●	●	●			Olika prevalens i olika länder	
Smittspårning = Förhållningsregler (under Smittspårning). Smittskyddslagen innebär för dessa sjukdomar att provtagning och behandling är gratis.	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nej	Nej	Nej	
	Partnerbehandling efter provtagning. Svar behöver ej inväntas.						Partnerbehandling efter provtagning rekommenderas. Behandlas bara vid positivt svar.			
Annat	Informera patienten om att kontrollprov inte behövs; risk för falskt svar. Vid positiv klamydia analt och anala besvär, tänk LGV (Lymfogranuloma venereum). Kontakta Hud/STI/Könsmottagning.	Vid positivt prov skall patient remitteras telefonledes skyndsamt till Hud/STI/Könsmottagning.	Endast HbsAg Vid positivt prov skall patienten remitteras till infektionsklinik.	Endast anti-HCV OBS! Anti-HCV kvarstår positivt efter utläkt infektion. Vid positivt prov skall patienten remitteras till infektionsklinik.	Vid positivt prov skall patient remitteras telefonledes skyndsamt till infektionsmottagning.	* Prov behöver normalt ej upprepas om det gått mer än 3 månader efter smittotillfälle. Vid positivt prov skall patient remitteras telefonledes skyndsamt till Hud/STI/Könsmottagning.	Provet ska inte tas som screening. Prov bör alltid tas om fortsatta besvär vid negativ klamydia/gc eller trots klamydia/gc-behandling.		För symptomlindring: behandling helst inom 72 tim.	
Rek. behandling	Doxycyklin Vid graviditet se Läke medelsverkets rekommendation.	OBS Ska alltid behandlas på Hud/STI/Könsmottagning där odling tas före behandling.	Rekommendera vaccination till män som har sex med män (msm) och personer som injicerar droger, kostnadsfritt.		Vid misstanke om sexuell riskbetende kontakta venerolog om PrEP (preexpositionsprofilax).		Azitromycin Obs! 5-dagars-behandlingen.	Behandling Se REK-listan.	Behandling Se REK-listan.	

Angelägenhetsgrad för provtagning ● = Hög ○ = Medel, överväg provtagning efter noggrann anamnes

Smittskydd Västra Götaland och Kunskapscentrum för sexuell hälsa

Frågor inför STI-provtagning

Frågor inför STI-provtagning VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

NOVEMBER 2022

Namn _____

Personnummer _____

Mobil _____

1. Varför söker du/varför vill du testa dig?

För säkerhets skull

Besvär

Kontaktad av partner

Smittspårning

2. Har du?

Penis

Vagina

.....

3. Har din/a sexpartner/s?

Penis

Vagina

.....

4. Hur har du haft sex det senaste året?

Analt

Oralt

Vaginalt

Annat

	Ja	Nej
5. Besvär?		
urinvägsbesvär/ont när du kissar		
flytningar		
mellanblödningar		
blödning i samband med sex		
ont nedtill i buken/underlivet/pungen		
sår, utslag, blåsor, klåda i underliv/pung/anus		
ömma lymfkörtlar		
ögonbesvär		
halsbesvär		
6. Har du under det senaste året haft analt, oralt, vaginalt sex med en ny eller tillfällig partner? Partners sexuella historia har betydelse.		
7. Har du haft sex utomlands? Vissa STIer kan vara vanligare i andra länder.		
8. Önskar du information om säkrare sex och kondomer?		
9. Har du frågor om din sexuella hälsa?		

Smittskydd Västra Götaland
 och Kunskapscentrum för
 sexuell hälsa

SRHR-nytt



Tack!

anna.skoglund@vgregion.se

eva.rundberg@vgregion.se

www.vgregion.se/ksh (Material)

Lärportalen [Utbildning: Sexuell hälsa i Primärvården- fokus på hiv/ STI](http://www.vgregion.se/utbildning)
([vgregion.se](http://www.vgregion.se))



VÄSTRA
GÖTALANDSREGIONEN