

Cytotec-behandling inför undersökning

För att underlätta ingreppet du ska genomgå, behöver du behandlas med ett läkemedel som heter Cytotec. Tabletterna innehåller ett kemiskt ämne, prostaglandin, som bland annat har egenskapen att livmoderhalsen mjuknar och börjar öppna sig.

Tabletterna för du in i slidan 3 timmar innan den inplanerade besökstiden här på mottagningen. Tabletterna kan ibland ge mensliknande smärta och de kan också ge en sparsam blödning. Därför kan du behöva ta smärtstillande samt använda ett smesskydd.

Samtidigt som du för in Cytotec-tabletterna i slidan ska du också svälja 2 tabletter paracetamol styrka 500 mg, till exempel tablett Panodil, Pamol eller Alvedon samt en tablett Ipren, Ibumetin eller liknande.

Dessa tabletter ska du ta dels för att lindra den smärta som du eventuellt får av Cytotec-tabletterna, men de är också förebyggande smärtlindring inför ingreppet som du ska genomgå.

Om du är gravid eller misstänker att du kan vara gravid ska du INTE ta tabletterna då de kan framkalla missfall.

Du ska hämta tablett Cytotec på Gynekologimottagningen cirka 1 vecka innan inplanerat besök. Du behöver inte beställa tid, anmäl dig i receptionen

Gynekologimottagningen är öppen:

Måndag – onsdag, fredag kl. 08:15 – 12.00

Måndag-torsdag kl. 13.00 – 15:30

Vid frågor eller problem är du välkommen att kontakta oss på mottagningen antingen via 1177.se eller ring 031-346 06 50