



Patientinformation

Masthugget gynekologi- och obstetrikmottagning

Till dig som får medicinsk behandling med Mifegyne/Mifepristone och Cytotec vid missfall

Ibland ges läkemedel för att livmodern ska dra ihop sig mer effektivt efter missfall. Tabletterna Mifegyne/Mifepristone och Cytotec är sådana mediciner.

Du börjar med 1 tablett Mifegyne/ Mifepristone 200 mg som du sväljer hos barnmorskan eller hemma. Du kan eventuellt bli illamående av tabletten. Om du kräks inom 30 minuter måste du ta en ny tablett. Vissa patienter får blödningar eller mensvärk efter cirka ett dygn. Får du ont kan du ta smärtstillande tabletter som du fått med dig från gynekologimottagningen.

24 timmar efter att du tagit Mifegyne/Mifepristone sväljer du smärtstillande medicin (2 st Alvedon 500 mg och 1 st Ibumetin 600 mg).

Vänta i 30 minuter och för sedan in fyra (4) Cytotec djupt in i slidan, på samma sätt som när du för in en tampong. Om du redan har börjat att blöda som en mens eller mer kan du i stället lägga Cytotec-tabletterna under tungan. Tabletterna kommer inte att lösas upp helt. När det gått minst 30 minuter sväljer du dem.

Om blödningen inte kommit i gång, eller är väldigt liten, 3 timmar efter att du tagit de 4 första tabletterna Cytotec för du upp ytterligare två (2) tabletter Cytotec i slidan.

1–4 timmar efter du har tagit Cytotec uppstår blödningar och smärta. Du kan uppleva intervallsmärtor och blodiga klumpar kommer ut. Ibland kan du även bli illamående eller få diarré. Behovet av smärtlindring är individuellt. Du får själv bedöma hur mycket smärtlindring du behöver. Värme på magen kan hjälpa. Du kan ta Alvedon 1 g var 6:e timme och Ibumetin 600 mg var 8:e timma. Om du får kraftigare smärta ta tablett OxyNorm 5 mg (sväljes). OxyNorm ger effekt efter ca 30 minuter. Du kan ta ytterligare 5 mg OxyNorm om du behöver.

Om du inte får någon blödning, avvakta en vecka innan du hör av dig. För att undvika infektion ska du inte bada, använda tampong/menskopp eller ha vaginala samlag under tiden du blöder.

Tecken på infektion eller komplikation efter eller under behandlingen kan vara:

- Riklig blödning, du blöder igenom två tjocka bindor varje timma under mer än tre timmar och blödningen fortsätter i samma omfattning.
- Feber (över 38 grader)
- Kraftig buksmärta som inte förbättras när du tar värktabletter

Får du någon av dessa symtom ska du söka till Gynekologisk akutmottagning, Sahlgrenska, Blå stråket 6, som är öppen dygnet runt, alla dagar.

Behöver du rådgivning under behandlingen?

Dagtid 07:30-15:00 kan du ringa till mottagningen på 031-346 06 50, välj 1 för återbud.

Under kvällar och helger ring 1177. Du kan också kontakta oss via 1177, e-tjänster.