



Patientinformation

Masthugget gynekologi- och obstetrikmottagning

Till dig som får medicinsk behandling med Cytotec vid missfall

Ibland ges läkemedel för att livmodern ska dra ihop sig mer effektivt efter missfall och abort. Tablett Cytotec är en sådan medicin.

Du sväljer 3 tabletter Cytotec á 0,2 mg.

När du börjar få lindrig mensvärk kan du börja med smärtstillande tabletter om du har fått med dig det hem från gynekologmottagningen. Ta tablett Ibuprofen 600 mg, 1 tablett var 8:e timma och tablett Alvedon 500 mg, 2 tabletter var 6:e timma.

Om du får kraftigare smärta ta 5 mg OxyNorm. Du kan ta ytterligare 5 mg OxyNorm om du behöver. Värme på magen kan också hjälpa. Behovet av smärtlindring är individuellt. Du får själv bedöma hur mycket smärtlindring du behöver.

Under behandlingen ökar blödningen från livmodern och sammandragningarna tilltar. Du kan uppleva intervallsmärtor och blodiga klumpar kommer ut. Ibland kan du även bli illamående och få diarré. Får du ingen blödning, avvakta en vecka innan du hör av dig eller bara vänta fram till ditt återbesök.

Tecken på infektion eller komplikation efter eller under behandlingen kan vara:

- Riklig blödning, du blöder igenom två tjocka bindor varje timma under mer än tre timmar och blödningen fortsätter i samma omfattning.
- Feber (över 38 grader).
- Kraftig buksmärta som inte förbättras när du tar värktabletter.

Får du någon av dessa symtom ska du söka till Gynekologisk akutmottagning, Sahlgrenska, Blå stråket 6, som är öppen dygnet runt, alla dagar.

För att undvika infektion ska du inte bada, använda tampong/menskopp eller ha vaginala samlag under tiden du blöder.

Behöver du rådgivning under behandlingen?

Dagtid 07:30-15:00 kan du ringa till mottagningen på 031 – 346 06 50, välj knappval 1 för återbud. Under kvällar och helger ring 1177. Du kan också kontakta oss via 1177, e-tjänster.