


Juni 2025



Nyhetsbrev nr 2 2025

Status ePed-instruktioner

Det finns för närvarande 860 godkända ePed-instruktioner i VGR.

Här är ett urval av nya instruktioner som kan vara bra att känna till:

- [Budesonid + Formoterol inhalation \(ex Symbicort\)](#)
- [Ciklesonid inhalation \(ex Alvesco\) inhalationsspray](#)
- [FlutikasonPROPIONAT + Formoterol inhalation \(Flutiform\) inhalationsspray](#)
- [FlutikasonFUROAT + Vilanterol inhalation \(Relvar Ellipta\) inhalationspulver](#)
- [Flutikason + Salmeterol inhalation \(ex Seretide Evohaler\)](#)
- [Järn\(III\)hydroxidpolymaltos oralt 2,5 mg Fe³⁺/droppe \(Maltofer\) orala droppar, lösning](#)
- [Järn\(III\)hydroxidpolymaltos oralt 100 mg Fe³⁺ \(Maltofer\) tuggtablett](#)
- [Kaliumfosfat intravenös inf 1 mmol/mL \(Addex-Kalium\)](#)
- [Posakonazol oralt 100 mg \(ex Noxafil\) tablett](#)
- [Tiotropiumbromid inhalation 2,5 mikrog/inh \(Spiriva Respimat\)](#)
- [Zink oralt \(ex Solvezink\)](#)

Ändrade instruktioner:

[Makrogol med eller utan elektrolyter oralt \(ex Movicol, Movicol junior, Forlax\)](#) är en ny instruktion som beskriver användning av makrogol vid obstipation hos barn 6 mån-18 år. Den ersätter tidigare ePed-instruktioner med makrogol som varit uppdelade utifrån elektrolytinnehållet. Dessutom finns nu även en instruktion för [Makrogol oralt \(Dulcosoft\)](#) godkänd. För behandling av barn under 6 mån hänvisas till [Makrogol + elektrolyter oralt \(ex Movicol Junior Neutral\) barn under 6 mån.](#)

Oralt järn

För drygt ett år sedan försvann de välkända järndropparna Niferex från marknaden. Sedan dess har licenspreparatet Glutaferro förskrivits, dock med vissa problem i form av dosering i milliliter, kort hållbarhet efter öppnande, krav på licensmotivering mm. Ett intensivt samarbete mellan centrala ePed-redaktionen och representanter från Svenska Neonatalföreningen har utmynnat i en uppdatering av riktlinjen för "Järntillskott för prematurfödda barn" ([Nutrition & Gastroenterologi - Svenska Neonatalföreningen](#)) där Maltofer orala droppar nu är det som rekommenderas. En [ePed-instruktion för Maltofer orala droppar](#) har publicerats.

Maltofer finns receptfritt på apotek i Sverige, men kan skrivas ut på recept om så önskas. I nuläget ingår Maltofer inte i läkemedelsförmånen.

Nytt vårdprogram för anafylaxi

Nytt [nationellt vårdprogram för anafylaxi](#) har publicerats 2024 av Svenska Föreningen För Allergologi. Rutinmässig steroidbehandling rekommenderas inte längre vid anafylaxi. Observera dock att hos patienter med befintlig astma, med astmasymtom i samband med anafylaxi, rekommenderas en stötdos perorala steroider som del i astmabehandlingen.

DexmedeTOMidin nasalt 100 mikrog/mL

Behandling med dexmedetomidin innebär risk för bradyarytmier och hypertension. Flera fall av bradykardi (även) i sent skede finns rapporterade. Läs ePed-instruktionen [Dexmedetomidin nasalt 100 mikrog/mL](#) noga! Här finns förutom doseringar även information om övervakning och hantering av bradykardi med mera.

Spädningsvätskor

På många instruktioner anges flera olika spädningsvätskor såsom Sterilt vatten, NaCl 9 mg/mL. Spädningsvätskorna står inte i prioritetsordning. I förekommande fall där en spädningsvätska är att föredra kommer det att framgå i beredningsinstruktionen.

Glucogel – förkortad hållbarhet

Hållbarhet för öppnad flaska Glucogel är ändrad till 1 månad för alla patienter.

Har du sett ...

Inbjudan till utbildningen, *Kan det vara tyfis? Eller spunk? En dag om infektioner och val av rätt kuckelimuckmedicin*. För mer information, se [inbjudan](#).

Kontakta oss

Skriv till vår funktionsbrevlåda, eped.vgr@vgregion.se, om du har synpunkter på ePed-instruktioner eller saknar en instruktion.

Sommarhälsningar!

ePed-redaktionen VGR

epost: eped.vgr@vgregion.se

hemsida: www.vgregion.se/eped

