



Barnmorskemottagningar, Regionhälsan

Patientinformation: ASA (acetylsalicylsyra) – förebyggande behandling under graviditet översatt till BKS.

Datum: 2025-02-10

ASA (acetilsalicilna kiselina) – preventivno liječenje tokom trudnoće

Preeklampsija znači visok krvni pritisak i prisutnost proteina u urinu. Preeklampsija se pojavljuje kod 2–8% svih trudnica i može biti ozbiljna komplikacija tokom trudnoće.

Zastoj rasta fetusa (IUGR) može ponekad biti povezan sa preeklampsijom, ali se može pojaviti i zasebno.

Preeklampsija i zastoj rasta fetusa su uzrokovani smanjenom funkcijom posteljice.

Više istraživanja je pokazalo da niska doza acetilsalicilne kiseline (ASA) kod žena koje spadaju u rizičnu grupu može poboljšati funkciju posteljice i smanjiti rizik i za preeklampsiju i za zastoj rasta fetusa. ASA tretman ne predstavlja nikakav ozbiljan rizik za trudnice ili za očekivano dijete.

Vama za koje se procijeni da imate povećan rizik za razvoj preeklampsije / zastoj rasta fetusa preporučuje se zato da uzimate nisku dozu ASA (75 mg) uveče.

Pažnja: Pokazalo se je da je preventivni učinak najbolji prilikom uzimanja baš uveče. Lijek se kupuje u apoteci na recept koji ćete dobiti od doktora u Savjetovalištu za trudnice i majke.

Tretman počinje u 10. do 12. sedmici trudnoće i traje do 36.+0 sedmice trudnoće.

Vi koji ste preosjetljivi na ASA ili druge lijekove za sputavanje upala (NSAID) nećete uzimati ovaj preventivni tretman. Ako imate čir na želudcu, hemofiliju, ili nedostatak trombocita u krvi (trombocitopeniju), takođe ne biste trebali koristiti ASA.

Ako su vaše ranije trudnoće imale komplikacije preeklampsije i/ili zastoj rasta fetusa, odgovorni doktor u vašem Savjetovalištu za majke i trudnice će ocijeniti da li će vam se ponuditi dodatne mjere tokom trudnoće.