


Информация для пациентов

Пластырь Эмла для проведения местной анестезии перед установкой и извлечением противозачаточного подкожного импланта

Пластырь Эмла можно приобрести в аптеке без рецепта. Для достижения наилучшего эффекта пластырь следует приклеить **за два часа** до визита. При установке и смене необходимо приклеить два пластыря, а при извлечении достаточно одного. Противозачаточный имплант вводится непосредственно под кожу с внутренней стороны верхней части недоминантной руки (той руки, которой Вы не пишете).

Возле локтя находится выступ кости.
Для того, чтобы его найти, проведите пальцем от локтя наискосок по направлению к телу




При установке противозачаточного импланта

Пластырь следует приклеить на расстоянии **8-10 см** от выступа кости.

Пластырь следует приклеить здесь:



При использовании двух пластырей Эмла, их края следует склеить таким образом, чтобы обезболивающие кружочки с местным анестетиком тесно прилегали друг к другу, см. рисунок



Извлечение противозачаточного импланта

на нижний край




При извлечении пластырь следует приклеить
противозачаточного импланта.

Смена противозачаточного импланта

Размещается также, как и при установке.

Обратите внимание, что первый пластырь
следует приклеить так, чтобы от края импланта

и до края пластыря расстояние было 1 см.



Крем Эмла в качестве анестезирующего препарата

При использовании крема Эмла в качестве анестезирующего препарата соблюдайте следующие инструкции:

- Приблизительно за два часа до визита крем следует нанести на внутреннюю сторону верхней части недоминантной руки (например, если Вы правша, то противозачаточный имплант будет устанавливаться в левую руку).
- Всё содержимое тюбика следует нанести полоской на ту область, где будет установлен противозачаточный имплант (см. рисунок выше).
- Покройте крем двумя предназначенными для этого пластырями (обычно прилагаются в упаковке). В этом Вам может понадобиться помощь.