



Barnmorskemottagningar

Patientinformation: GBS under graviditet översatt till BKS

Datum: 2025-07-03

# GBS tokom trudnoće

## GBS (grupa B streptokoka)

Grupa B-streptokoka, skraćeno GBS, su bakterije koje se prirodno nalaze u crijevima. One ponekad mogu ući u vaginu ili mokraćni kanal i često se takođe nalaze na koži. Svaka treća žena u reproduktivnoj dobi je nosilac GBS-a u spolnim organima, bez da ima simptome. Pošto je to toliko često, smatra se normalnom varijantom, a ne stanjem bolesti. Prisustvo bakterija nema nikakve veze sa higijenom spolnih organa i ne zavisi od toga koliko često se perete. Takođe nije u pitanju zaraza i GBS se ne smatra spolnom bolešću.

## GBS tokom trudnoće

Većina trudnica koje imaju GBS nemaju nikakve simptome i njihova djeca se rađaju potpuno zdrava. U rijetkim slučajevima bakterija može prouzrokovati infekciju urinarnog trakta koja dovodi do bola tokom mokrenja i potrebe da se često mokri.

Često je, međutim, da se niski nivoi GBS-a nađu u urinu bez simptoma infekcije urinarnog trakta. U tim slučajevima se prisustvo bakterija ne liječi antibioticima. Razlog tome je što je vrlo teško ukloniti bakterije antibioticima, one se vrlo često vraćaju. Ponovljena liječenja antibioticima rizikuju stvaranje rezistencije bakterija (da postanu otporne na

antibiotike). Takođe ne postoje nikakvi dokazi da liječenje antibioticima kod prisustva bakterija „pomaže“ ili sprječava bolest kod djeteta.

## Antibiotici na porođaju

Umjesto toga se kod utvrđene nosivosti GBS-a budućoj majci antibiotici daju samo tokom porođaja. Lijek (penicilin, kod alergije na penicilin daje se drugi antibiotik) se daje intravenozno na svakih šest sati tokom porođaja. Razlog što je izabran taj način je taj što GBS u rijetkim slučajevima može da uzrokuje infekciju kod djeteta koje tada može da postane vrlo bolesno.

Smatra se da se bakterija može prenijeti na dijete tokom samog porođaja, kada dijete prolazi kroz vaginu. Zato se antibiotici ne daju kod planiranog carskog reza, jer dijete tada ne prolazi kroz vaginalni kanal.

Djeca koja su rođena prerano imaju veći rizik da se razbole. Zato se antibiotici često daju ženama koje se porode prerano, čak i ako GBS nije nađen tokom trudnoće.

## Žene koje su pretrpjele komplikacije tokom ranijih trudnoća

Žene koje su imale komplicirane trudnoće ranije u kojima se sumnja da je GBS možda uticao na ishod, liječe se po posebnoj proceduri. Ovdje se tretman može morati prilagoditi, ponekad sa dodatnim ispitivanjima. Vaša babica i doktor u Domu zdravlja za trudnice i majke će vam dati savjete.