



Barnmorskemottagningar

Patientinformation QuantiFERON-screening för tuberkulos (TB) översatt till ryska

2025-07-03

Информация для пациентов Тест QuantiFERON – скрининг на туберкулёз (ТБ)

Почему Вам предложили пройти тест QuantiFERON?

Охрана здоровья беременных и рожениц предлагает всем беременным женщинам, которые приехали из стран с более высоким уровнем заболеваемости туберкулёзом (ТБ или ТБС) пройти тест (анализ крови). Тест также предлагается беременным женщинам, которые жили в лагерях для беженцев или в других местах с повышенным уровнем риска заражения туберкулёзом.

Что такое туберкулёз (ТБ)?

Туберкулёз – это инфекционное заболевание, вызываемое бактериями туберкулёза. Заболевание чаще всего поражает лёгкие, но и другие органы также могут быть инфицированы. Туберкулёз является серьёзным заболеванием, и распространён во многих

странах мира. Ежегодно в Швеции заболевают около 600–700 человек. Большинство из заболевших здесь родились за пределами Швеции.

Как можно заразиться туберкулёзом?

Заразиться туберкулёзом можно от взрослых людей с открытой формой туберкулёза лёгких. Бактерии передаются воздушно-капельным путём, когда больной кашляет и другой человек вдыхает маленькие капельки, содержащие бактерии. Заражение туберкулёзом в основном происходит при близком и длительном контакте.

Быть носителем латентной инфекции или болеть туберкулёзом - в чем разница?

В организме больных туберкулёзом имеется большое количество активных бактерий. Как правило, у них (больных туберкулёзом) есть симптомы болезни (кашель, потеря веса и температура). Если не проводить лечения, бактерии могут распространиться и поразить другие органы. Без лечения туберкулёз может привести к необратимым повреждениям и смерти.

У человека, который инфицирован, но не болен, имеется так называемый латентный (дремлющий) туберкулёз. Количество бактерий значительно меньше, и они не активны. Носитель латентной инфекции не болен и не может заразить других. Впоследствии бактерии могут активироваться, и тогда человек заболевает. Поэтому, для предотвращения в будущем болезни, носителю латентной инфекции можно дать лекарство, так называемое профилактическое лечение. Во время беременности это особенно важно, поскольку сразу после родов существует

повышенный риск перехода дремлющей (латентной) формы в активную, заразную форму туберкулёза. В таком случае женщина может заразить своего новорождённого ребёнка, что может иметь серьёзные последствия.

Почему тестируют с помощью теста QuantiFERON?

Тест QuantiFERON может выявить как активную (заразную), так и латентную (дремлющую) формы туберкулёза. Активный туберкулёз необходимо лечить без промедления. Важно также выявить беременных с латентной формой туберкулёза, поскольку в некоторых случаях необходимо профилактическое лечение с помощью лекарств. Это лечение начинают, как правило, после беременности. В таком случае снижается риск того, что женщина заболит активным туберкулёзом и что ребёнок заразится.

Как проводится тест QuantiFERON?

В женской консультации у вас из вены возьмут кровь, которая будет исследована в лаборатории. Результат будет сообщён вашей акушерке в течение нескольких дней.