

معلومات للمريضة الحامل التي تعاني من اضطرابات في الغدة الدرقية

تقوم القابلة بأخذ عينة دم من جميع النساء الحوامل لعمل فحص هرمون منبه الدرقية (TSH) وذلك للتعرف على فعالية الغدة الدرقية في مرحلة مبكرة من الحمل. يعتبر هذا مهما لاكتشاف ومعالجة كل من الفعالية المنخفضة أو المرتفعة للغدة الدرقية.

يمكن أن تختلف فعالية الغدة الدرقية بأشكال مختلفة

- يمكن أن تكون فعالية الغدة الدرقية طبيعية تماما
- يمكن أن تكون فعالية الغدة الدرقية منخفضة (قصور الدرقية) مما يعني نقص في هرمون الغدة الدرقية (تيروكسين) وعندها يكون مستوى الهرمون منبه الدرقية مرتفعا. إن هذه الحالة معقدة ويتم معالجتها بدواء (Levaxin®) ليفاكسين.
- يمكن أن تكون فعالية الغدة الدرقية مرتفعة (فرط الدرقية) وبذلك يكون هناك كثير من هرمون الغدة الدرقية (تيروكسين). في هذه الحالة تكون نسبة هرمون منبه الدرقية منخفضة. إن هذه الحالة نادرة أكثر بالمقارنة مع انخفاض الفعالية. في بعض الأحيان قد يتطلب الأمر المعالجة بالأدوية أو إجراء عملية جراحية.
- يمكن أن تكون فعالية الغدة الدرقية طبيعية تماما ولكن وبالرغم من ذلك يكون هناك انحراف في النتائج في مرحلة الحمل المبكرة. يعود سبب ذلك إلى أن الجسم ينتج هرمونات أخرى مثل ما هو الحال خلال الحمل والتي يمكن أن "تخدع" عند أخذ العينات وتشير بشكل خاطئ إلى وجود انحراف في فعالية الغدة الدرقية. يتم اكتشاف هذه الحالة عن طريق تكرار أخذ العينات للفحص.

إن قيم الغدد الدرقية طبيعية تماما لديك.

إن قيم هرمون منبه الدرقية (TSH) لديك مرتفعة مما يعني أن فعالية الغدة الدرقية منخفضة لديك.

إن قيم هرمون منبه الدرقية (TSH) لديك منخفضة مما يعني أنه إما توجد فعالية طبيعية تماما لعمل الغدة الدرقية لديك ولكن هناك قيم منحرفة بصورة مؤقتة أو أنه يوجد لديك فعالية مرتفعة للغدة الدرقية. سيتم التواصل معك حول عمل المزيد من أخذ العينات بشكل تكميلي وربما تقديم معلومات لك من قبل الطبيب.

إذا كانت فعالية الغدة الدرقية منخفضة لديك وبحاجة إلى (Levaxin®) ليفاكسين

تم معالجة عدد كبير من الحوامل بدواء (Levaxin®) ليفاكسين ولم تتبين أي مخاطر معروفة من وراء هذه المعالجة خلال فترة الحمل. يمكن أن تعانين بعض النساء عوارض جانبية، مثلا خفقان القلب، شعور بالحرارة أو ارتجاف ولكن من المعتاد أن تكون حالة الحامل كالمعتاد تماما خلال فترة المعالجة باستخدام (Levaxin®) ليفاكسين. يلزم أن يتم بصورة كبيرة تعديل جرعة (Levaxin®) ليفاكسين خلال فترة الحمل وبناء عليه فسنتقوم القابلة المسؤولة عنك بأخذ عينات لعمل فحص هرمون منبه الدرقية بصورة منتظمة، وفي أغلب الأحيان إلى أسبوع الحمل 25. عليك الحضور بصورة مبكرة قبل الوضع للحصول على معلومات عن وكيف ستستمر معالجتك بعد وضع الطفل.

لقد حصلت على وصفة الكترونية مع جرعة

يجب أن يتم تغيير الجرعة التي تتعاطينها من

لقد حصلت على وصفة الكترونية تكميلية مع جرعة

يجب البقاء على الجرعة الحالية

بعد الوضع يجب تغيير الجرعة إلى

موعد أخذ عينة فحص الدم القادم بعد حوالي أسبوع. ستقوم القابلة المسؤولة عنك بتقديم المعلومات لك عن الموعد والمكان.

إلى المرأة التي تعالج باستخدام (Levaxin®) ليفاكسين

لا يفوتك أنه لا يجب أخذ مستحضرات الحديد في نفس الوقت مع (Levaxin®) ليفاكسين، لأن الحديد يقلل من امتصاص هرمون الغدة الدرقية (التيروكسين). إذا كنت تتعاطين كل (Levaxin®) ليفاكسين ومستحضرات الحديد – يجب عليك الانتظار ساعتين على الأقل بين مرات التعاطي.