



ADL-bedömning vid minnesutredning

Skapat av: RPT Kognitiv svikt vid misstanke om demenssjukdom

Administreras av: Processtöd för implementering i primärvård

Godkänt av: Primärvårdsrådet

Giltigt till: 2027-12-31

ADL-bedömning vid minnesutredning

Arbetsterapeuten gör en intervju utifrån ADL-taxonomi eller liknande instrument. Detta för att få patientens bild över hur dennes vardag fungerar. Kontrollera även med anhörig eller hemvårdspersonal om patientens egen bild stämmer.

Utifrån resultatet väljs lämplig aktivitet för observation. Den aktivitet som väljs ska vara en aktivitet som patienten utför, men som det finns vissa problem med/patienten inte är helt självständig i. Vilket instrument som väljs att använda beror på vad aktuell utredare har i sin kunskapsbank, till exempel AMPS eller AWP/AWC. I bedömningen ingår att observera patientens kognitiva och motoriska förmåga.

Använd någon eller flera av följande KVÅ-koder för registrering av ADL-bedömningen

- AV131 Bedömning av kroppsfunktioner (t.ex. minnes-, syn-, hjärt-, andnings- och muskelkraftsfunktioner) med standardiserade bedömningsinstrument/metoder
- AV132 Bedömning av aktivitetsförmåga (t.ex. att genomföra daglig rutin, tala, använda transportmedel, sköta sin egen hälsa, skaffa bostad, bistå andra, samt att engagera sig i samhällsgemenskap)
- AV133 Bedömning av aktivitetsförmåga (t.ex. att genomföra daglig rutin, tala, använda transportmedel, sköta sin egen hälsa, skaffa bostad, bistå andra, samt att engagera sig i samhällsgemenskap) med standardiserade bedömningsinstrument/metoder