



Patientinformation

Masthugget gynekologi och obstetrikmottagning, Regionhälsan

## Till dig som har fått behandling för Bartholinit

### Vad är Bartholinit?

Bartholinis körtlar ligger på insidan av yttre blygdläpparna. Ungefär 2 % får en cysta eller böld i körteln. Åkomman är vanligast i åldersgruppen 20–29 år. Behandlingen är att öppna bölden och lägga in dränage, så att utförsgången hålls öppen tills den har läkt.

### Behandling

Du har fått behandling med Word-kateter. Det är en liten gummikateter som fylls med några milliliter koksalt så att det bildas en ballong som håller den kvar på plats i körteln. Syftet är att det skall bildas en ny utförsgång från körteln. Ballongen ligger inuti körteln, men en liten gummislang håller utförsgången öppen och den kan du känna med ditt finger. Bekvämast är att peta den inuti slidan så att den inte skaver.

### Vad kan Du förvänta dig

Ballongen ligger inuti körteln, men en liten gummislang håller utförsgången öppen och den kan du känna med ditt finger. Bekvämast är att peta den inuti slidan så att den inte skaver. Det rinner vätska och

ibland lite blod från körteln första dagarna, använd binda i stället för tampong. Det går bra att duscha med katetern på plats men undvik bad. Penetrerande vaginala samlag kan genomföras men det kan kännas obehagligt för båda parter.

## Smärta

Vanligtvis blir det en omedelbar lättnad av smärtan som bölden/cystan har orsakat när man sätter in katetern. En lindrigare smärta kan sitta i ytterligare några dagar. Använd gärna receptfria läkemedel som Alvedon eller Ibuprofen vid behov. Om du har svårare smärtor eller tryckkänsla de första dagarna efter att katetern har lagts och smärtstillande inte hjälper kan man pröva att dra ut vätska från ballongen som sitter i körteln. Kontakta i så fall mottagningen.

## Råd och hjälp

Om ballongen ramlar ut fullständigt innan återbesöket ringer du mottagningen för rådgivning.

Sök gynekologisk akutmottagning på Sahlgrenska, Blå stråket 6, om du får:

- Feber över 38 graders vid två tillfällen med en halvtimmes mellanrum
- Du blöder igenom två bindor per timma.
- Svåra smärtor där smärtstillande inte hjälper.

## Återbesök

Återbesök planeras efter 3–4 veckor för att dra ut katetern. Kallelse får Du med Dig innan Du går hem.

## Kontaktinformation

Kontakta mottagningen via [1177.se](https://www.1177.se) eller ring 031-346 06 50. Vid akuta frågor kvällar och helger ringer du 1177.