

Blankett

Skapat datum: 2025-12-12

Publicerat för Masthugget Gynekologimottagning Regionhälsan

## Provokations- / kvantifieringstest

Namn: \_\_\_\_\_

Personnummer: \_\_\_\_\_

### Instruktioner

Patienten dricker ej 2 timmar före testet. Kissar inför undersökning.

Blåsan fylls med 300 ml natriumklorid via tappningskateter.

Annan mängd: \_\_\_\_\_

På grund av: \_\_\_\_\_

Bindans vikt före test: \_\_\_\_\_

Viktökning efter test: \_\_\_\_\_

Test A eller B beroende på patientens förmåga:

#### Test A

Läckage (egen uppfattning)	
Hosta hårt 5 gånger	
Spring på stället i 1 minut	
Jämfotahopp på stället 0,5 minut	
Svikthopp med benföring ut och ihop 0,5 minut	
Tvätta händerna i rinnande kylslaget vatten i 1 minut	

#### Test B

Läckage (egen uppfattning)	
Hosta hårt 5 gånger	
Sätta sig och resa sig upp från stol	

Plocka upp penna från golvet 4 gånger	
Upp på tå och trampa ner hälen 8-10 gånger	
Tvätta händerna i rinnande kylslaget vatten i 1 minut	

Patienten kissar  
efteråt

Ja

Nej

Barnmorska:

---

Datum:

---

**KVÅ-kod:** AK064 Blåsfyllnadstest och läckageprovokation