

Gäller för: 1177 på telefon VGR

Giltig från: 2024-12-20

Innehållsansvar: Anne Häggendal, (anhag), Distriktsläkare

Giltig till: 2026-12-20

Granskad av: Anne Häggendal, (anhag), Distriktsläkare

Godkänd av: Jill Johansson, (jiljo), Verksamhetschef

Rutin

Felaktig dos blodförtunnande läkemedel, extra dos

Syfte

Att underlätta rådgivningen till person som av misstag tagit extra dos blodförtunnande läkemedel.

Beskrivning

Dokumentet kan användas för att förenkla rådgivningen då patient av misstag tagit marginellt ökad dos blodförtunnande medicinering. Vid osäkerhet avseende mängd läkemedel skall patient hänvisas till akutmottagning eller motsvarande.

Waran/Warfarin

- Vid dubbel dos- avstå nästa ordinerade Warandos och fortsätt därefter behandling enligt ordination. Nästa vardag nytt PK-prov och kontakt med AK-mottagning.
- Vid osäkerhet om extra dos- avstå nästa ordinerade Warandos och fortsätt därefter enligt ordination. Nästa vardag nytt PK-prov och kontakt AK-mottagning.
- Om dagar i schemat förväxlat- fortsätt behandling enligt aktuellt schema.

Eliquis (dosering två gånger dagligen)

- Vid dubbel dos- avstå nästa ordinerade dos och återuppta behandlingen två gånger dagligen efter 24 timmar.

Pradaxa (dosering två gånger dagligen)

- Vid dubbel dos- avstå nästa ordinerade dos och återuppta behandlingen två gånger dagligen efter 24 timmar.

Xarelto (dosering en gång dagligen)

- Vid dubbel dos-fortsätt behandlingen som vanligt nästa dag
(dosering en gång dagligen)

Lixiana (dosering en gång dagligen)

- Vid dubbel dos-fortsätt behandlingen som vanligt nästa dag

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: 1177 på telefon VGR

Innehållsansvar: Anne Häggendal, (anhag), Distriktsläkare

Granskad av: Anne Häggendal, (anhag), Distriktsläkare

Godkänd av: Jill Johansson, (jiljo), Verksamhetschef

Dokument-ID: RHS9923-1711477075-12

Version: 3.0

Giltig från: 2024-12-20

Giltig till: 2026-12-20