

Gäller för: Göteborg flyktingmedicinsk mottagning
Innehållsansvar: Anne Picard, (annpi13), Specialistläkare
Granskad av: Eva Theunis, (evath15), Distriktsläkare
Godkänd av: Matilda Vasilis, (maten2), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-04-24

Giltig till: 2028-04-24

Vid vaccination med MPR-vaccin och tetravac

Bakgrund

2024-03-15 beslutade Regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen att från 1 april 2024 erbjuda kostnadsfri vaccination för dem som vid medicinsk bedömning bedöms ha ett otillräckligt skydd mot [mässling, påsjuka, röda hund och/eller difteri, stelkramp, polio och kikhosta](#).

Se även: [Regional medicinsk riktlinje: Hälsoundersökning för asylsökande och övriga berättigade](#)

Åtgärd inför vaccination av aktuellt vaccin

- Inför att vaccination administreras försäkras sig sjuksköterska om att checklista är ifylld och att det inte föreligger några kontraindikationer mot vaccinationen.
- Vid tveksamhet om risk/ kontraindikation alternativt om patienten står på några läkemedel konsulteras läkare i tjänst.
- Hos fertila personer med osäkerhet kring graviditet, tas u-hCG. OBS! u-hCG kan ge utslag 7-10 dagar efter befruktning, men kan inte säkert uteslutas med gravtest förrän 11 dagar efter den förväntade menstruationen skulle börjat. Om risk för graviditet som inte går att detektera får vaccinationen erbjudas vid senare tillfälle.
- Informera patienten om vaccination på dennes språk [MPR](#) och [difteri, stelkramp, kikhosta](#). Fertila personer som ska ges MPR-vaccin informeras om risk för ev. fosterskador.
- Om det är aktuellt med vaccinering:

1. Iordningställ och förbered injektionen på lab.
2. Vid behov av graviditetstest, lämna mugg och etikett där patientens namn och födelsedata/ reservnummer framgår.
3. Knacka på lab, när urinprovet ställs i luckan. Testet analyseras av personal på lab, som lämnar besked om svar innan vaccinationen ges.
4. Vaccinet ska injiceras omedelbart efter färdigställande. Om detta inte är möjligt ska det förvaras vid 2 °C-8 °C (i kylskåp) och användas inom 8 timmar efter färdigställande.
5. Före administrering ska spädningsvätska och färdigberett vaccin inspekteras visuellt. Inga främmande partiklar och/eller utseendemässiga förändringar får förekomma. Observeras sådana ska spädningsvätskan eller det färdigberedda vaccinet kasseras.
6. För instruktioner angående administrering se:
7. MPR: [Priorix®](#), [Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning](#)
8. Difteri, stelkramp, polio och kikhosta: [Tetravac® - FASS Vårdpersonal](#)

Vid eventuell anafylaktisk reaktion eller allergi ges läkemedel enligt personlig delegering och schema.

Dokumentation

9. Välj: Nytt
10. Läkemedel - vaccination
11. Enstaka
12. Morbili, parotit, rubella och/ eller difteri, stelkramp, polio och kikhosta
13. Välj aktuellt vaccin och innehåll.
14. Administrera, glöm inte att fylla i batch nummer. Signera administration
15. Skriv en journalanteckning där det också framgår att checklista fyllts i, t.ex. *“Info om MPR-vaccin till patient. Se läkemedelsjournal. Konsulterar läk xx inför att aktuellt MPR-vaccin gives med anledning av att har blodförtunnande beh...”*
16. Åtgärdskod:
17. MPR: [UX665](#)
18. Difteri, stelkramp, polio och kikhosta: [UX663](#)

Vaccinationsschema

Vaccinationsschema skickas med patienten och får en bokad tid för nästa vaccination.

Administration inför besöket

Hälsoundersökningspatienter och tolkar till besöket bokas 1 timma.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Göteborg flyktingmedicinsk mottagning

Innehållsansvar: Anne Picard, (annpi13), Specialistläkare

Granskad av: Eva Theunis, (evath15), Distriktsläkare

Godkänd av: Matilda Vasilis, (maten2), Verksamhetschef

Dokument-ID: RHS9926-1306825477-53

Version: 4.0

Giltig från: 2026-04-24

Giltig till: 2028-04-24