

Spiralinsättning på kvinnor med ökad blödningsbenägenhet

Förtydligande: Förutom för kvinnor gäller riktlinjen för andra personer med livmoder.

Förändringar sedan föregående version
Spiralinsättning på patient med ökad blödningsbenägenhet kan utföras på Masthuggets gynekologimottagning.

Utförande

Definition, ökad blödningsbenägenhet

- Använder läkemedel med antikoagulantiaeffekt, såsom Waran, Xarelto, Eliquis, Lixiana, Pradaxa. Vid tveksamhet om ett preparat, konsultera koagulationsspecialist
- Använder Fragmin, Innohep, Klexane **i behandlingsdos**. Kvinna som står på **profylax** med lågmolekylärt heparin i normal dos (max 5 000 E Fragmin dagligen eller motsvarande) kan få spiral insatt på barnmorskemottagning (BMM) minst 12 timmar efter senast given injektion
- Blödningsrubbing, diagnosticerad av koagulationsspecialist, såsom von Willebrands sjukdom

Applicering av klotång eller en eventuell perforation kan, på en kvinna med ökad benägenhet, orsaka en större blödning som kan vara svår att hantera på en BMM. Spiralinsättning ska därför ske på gynnottagning på sjukhus i dessa fall. Spiralinsättning på patient med

ökad blödningsbenägenhet kan också utföras på Masthugget gynekologimottagning.

Barnmorska konsulterar MHV-läkare eller gynekolog som skriver remiss till gynekologmottagning. Remissen ska innehålla uppgifter om:

- blödningsrubbnig
- hälsotillståndet i övrigt
- allergier/överkänsligheter
- all medicinering, inklusive doser
- paritet och andra relevanta gynekologiska uppgifter

Ansvar

Mödrahälsovårdsöverläkare ansvarar för innehållet i riktlinjen.

Områdeschefer och enhetschefer ansvarar för att riktlinjen implementeras och efterlevs.

Arbetsgrupp

Innehållsansvarig

Karin Jerhamre Sundh, mödrahälsovårdsöverläkare, Centralt mödrahälsovårdsteam (CMHV), Regionhälsan.

Innehållsgranskare

Anna Trollstad, mödrahälsovårdsöverläkare, CMHV, Regionhälsan.

Anna-Karin Broman, mödrahälsovårdsöverläkare, CMHV, Regionhälsan.

Antje Johannsmeyer, mödrahälsovårdsöverläkare, CMHV, Regionhälsan.

Godkännare

Maria Gjertsen, regionområdeschef, barnmorskemottagningar och gynekologi, Regionhälsan.

Information om handlingen

Handlingstyp: Riktlinje verkställighet

Gäller för: Barnmorskemottagning och gynekologi

Innehållsansvar: Karin Jerhamre Sund, (karje1), Överläkare

Granskad av: Anna Trollstad, (anntr1), Överläkare, Anna-Karin Broman, (annbr25), Överläkare, Antje Johannsmeyer, (antjo1), Överläkare

Godkänd av: Maria Gjertsen, (marem2), Regionområdeschef

Dokument-ID: RHS9927-391389789-100

Version: 4.0

Giltig från: 2025-03-28

Giltig till: 2027-03-28