

Allergisk reaktion

Förändringar sedan föregående version

En lathund är tillagd under Relaterad information.

Bakgrund och syfte

Underlätta behandling vid allergisk reaktion.

Utförande

Vid kraftig lokal reaktion (undantaget i andningsvägarna)

- Tablett desloratadin (ex Desloratadin®, Aerius® alt Careadin®) munsönderfallande tablett 5 mg, 2 tabletter (10 mg) placeras i munnen, alternativt tablett desloratadin tablett 5 mg, 2 tablett som sväljes alt. mixtur desloratadin 0,5mg/ml 20 ml som engångsdos.
- Övervakning i 30 minuter.
- Kontakta läkare på vårdcentral alternativt jourläkare om kvarstående besvär.
- Vid övergående besvär under övervakningstiden konsultera MHV-läkare/läkare på Spec-MVC för remiss till vårdcentral eller allergologisk mottagning för utredning.

Urtikaria/Ödem

Symtom: obehagskänsla, klåda, flush, urtikaria, Quinckeödem.

Larma internt, kontakta och tillkalla läkare om läkare finns i närheten. I annat fall larma ambulans.

Ge sedan omedelbart:

- Tablett betametason (Betapred®) 0,5 mg, 10 stycken upplösta i vatten (kan även sväljas eller tuggas).
- Tablett desloratadin (ex ,Desloratatin®, Aerius® alt tabl Caredin®) munsönderfallande tablett 5 mg, 2 tabl (10 mg) placeras i munnen, alternativt tablett desloratadin 5 mg, 2 tabl (10 mg) som sväljes alt mixtur desloratadin 0,5mg/ml 20 ml som engångsdos.

Om ej förbättrad:

- Injektion adrenalin (ex Epipen® alt Jext®) 300µg/dos djupt intramuskulärt i lårets utsida. Kan upprepas efter 15 minuter.
- Sätt intravenös infart.
- Kontrollera bltr och puls samt ev saturation
- Transport till sjukhus.

Anafylaxi/chock

Symtom: myrkrypningar, illamående, blodtrycksfall, andningssvårigheter.

- Larma internt, tillkalla läkare om läkare finns i närheten alternativt ring 112.
- Tippa huvudändan
- Injektion adrenalin (Epipen® alt Jext®) 300µg/dos djupt intramuskulärt i lårets utsida. Kan upprepas efter 15 minuter.
- Tablett betametason (Betapred®) 0,5 mg, 10 stycken upplösta i vatten (kan även sväljas eller tuggas).
- Tablett desloratadin (ex Desloratadin®, Aerius® alt Caredin®) munsönderfallande tabl 5 mg, 2 tabl (10 mg) placeras i munnen, alternativt tablett desloratadin tabl 5 mg, 2 tabl (10 mg) som sväljes alternativt mixtur desloratadin 0,5mg/ml 20 ml som engångsdos.
- Sätt minst en intravenös infart.

- Infusion Ringer - acetat intravenöst i mycket snabb infusion.
- Transport till sjukhus.
- Glöm ej patient ID och kontakt med anhöriga!

Relaterad information

[Lathund Allergisk reaktion Barnmorskemottagningar VGR](#)

Källförteckning

[REK-listan \(vgregion.se\)](#)

[Generella direktiv - ordination av läkemedel Barnmorskemottagningar VGR](#)

[Nationellt vårdprogram anafylaxi](#)

Ansvar

Mödrahälsovårdsöverläkare ansvarar för innehållet i riktlinjen. Områdeschefer och enhetschefer ansvarar för att riktlinjen implementeras och efterlevs.

Arbetsgrupp

Innehållsansvarig

Anna Hagman, mödrahälsovårdsöverläkare M4, Regionhälsan.

Innehållsgranskare

Anna-Karin Broman, mödrahälsovårdsöverläkare M1, Regionhälsan.

Antje Johannsmeyer, mödrahälsovårdsöverläkare M3, Regionhälsan.

Karin Jerhamre Sundh, mödrahälsovårdsöverläkare M4, Regionhälsan.

Anna Trollstad, mödrahälsovårdsöverläkare M5, Regionhälsan.

Godkännare

Maria Gjertsen, regionområdeschef Regionhälsan.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Barnmorskemottagning och gynekologi

Innehållsansvar: Anna Hagman, (annha67), Överläkare

Granskad av: Anna-Karin Broman, (annbr25), Överläkare, Antje Johannsmeyer, (antjo1), Överläkare, Karin Jerhamre Sund, (karje1), Överläkare, Anna Trollstad, (anntr1), Överläkare

Godkänd av: Maria Gjertsen, (marem2), Regionområdeschef

Dokument-ID: RHS9927-391389789-39

Version: 5.0

Giltig från: 2025-04-04

Giltig till: 2027-04-04