

## Minifall Tecken på allvarlig infektion

2019-05-22, reviderat senast 2023-03-10, kollat 2026-03-16

Om ni har valt Minifall Tecken på allvarlig infektion som del av ert självdeklarationsarbete, ska ni diskutera alla de tre korta journalanteckningarna (1a-c). Är diagnosen adekvat? Var handläggningen adekvat? Har riktlinjerna följts? Är det uppgifter som saknas?

### Minifall Tecken på allvarlig infektion 1 a

#### Benjamin 4 år

##### ANTECKNING

**Kontakttyp** Mottagningsbesök oplanerat

**Kontaktorsak** Feber och hosta

##### ANAMNES

**Aktuellt** Benjamin hade hög feber när han vaknade i morse. Igår mådde han bra. På förmiddagen börjat hosta. Varit tungandad men inte haft pipande andningsljud. Inte orkat leka. Inte ätit idag men har druckit och kissat.

##### STATUS kl 13.00

**Allmäntillstånd** Trött och hängig men vaken. Temp 41,2 °C. Inte nackstel.

**Munhåla och svalg** Oretat.

**Lymfkörtlar** Inga förstörade lymfkörtlar på sedvanliga lymfkörtelstationer.

**Öron** Bilat oretade normalställda trumhinnor med normal rörlighet.

**Hjärta** Inga biljud. Hjärtfrekvens 145 slag per minut.

**Lungor** Inga rassel eller ronki. Inga indragningar. Andningsfrekvens 28 per minut.

**Buk** Mjuk och oöm.

##### BEDÖMNING/ÅTGÄRD

Tar CRP som är 18 vilket talar mot bakteriell infektion. Hjärtfrekvensen som förväntat vid hög feber. Andningsfrekvens 28 per minut är OK vid denna ålder. Bedöms som virusinfektion. Får gå hem. Bokar telefonuppföljning imorgon förmiddag. Noggrann information till föräldrarna att de ska söka akut vid försämring.

##### DIAGNOS ENL ICD-10

J209 Akut bronkit, ospecificerad

## Minifall Tecken på allvarlig infektion 1 b

### Anders 66 år

#### ANTECKNING

<b>Kontakttyp</b>	Mottagningsbesök oplanerat
<b>Kontaktorsak</b>	Kräkningar

#### ANAMNES

Aktuellt	Anders är ensamboende och har för 6 månader sedan erhållit diagnosen KLL. Han kommer inte ihåg sina mediciner men en sort är kortison, troligen dosen 10 mg. Vaccinerad mot influensa och covid 19 i höstas. Han insjuknade igår em med en enstaka kräkning och idag under förmiddagen kräkts vid 3 - 4 tillfällen. Ingen påtaglig buksmärta, ingen diarré, tillkomst av lätt hosta, ingen feber.
----------	---

#### STATUS kl. 13.00

Allmäntillstånd	Helt vaken, klar, temp 37,1°C. Normal hudturgor.
Lymfkörtlar	Förstorade lymfkörtlar i axiller
Hjärta	Inga biljud. Hjärtfrekvens 98 slag per minut.
Lungor	Slembiljud bilat, inga säkra rassel. Andningsfrekvens 26 per minut.
Buk	Mjuk och oöm.

#### BEDÖMNING/ÅTGÄRD

CRP är 69. Ingen feber. Immunsupprimerad men förefaller vara i gott skick, dricker bra. Invändningsfritt bukstatus. Hosta har han haft tidigare. Allmänna råd om att dricka mycket, erhåller recept Cocillanetyfin.

#### DIAGNOS ENL ICD-10

A099 Gastroenterit

## Minifall Tecken på allvarlig infektion 1 c

### Olof 82 år

#### ANTECKNING

**Kontakttyp** Mottagningsbesök oplanerat

**Kontaktorsak** Ostadighet

#### ANAMNES

**Aktuellt** Bor hemma med frisk hustru. Har en dålig höft och medicinerar mot hjärtsvikt, men klarar sig normalt helt själv. Hustrun berättar att han igår eftermiddag när han kissade sista gången sa att det sved lite. Gick och la sig tidigt. När hustrun vaknar så är han förvirrad, känns varm och har svårt att stå på benen. Hustrun orolig att han är allvarligt sjuk.

#### STATUS kl 09.40

**Allmäntillstånd** Vaken, orienterad till person men ej till tid och rum. Ej nackstyv. Temp 38,9°C men blek och lätt fuktig hud. Benen viker sig när han försöker resa sig.

**Lymfkörtlar** Förstorade lymfkörtlar i axiller.

**Hjärta** Inga biljud. Frekvens 100.

**BT** 115/75

**Lungor** Bilat u.a.

**Buk** Mjuk och oöm. Ingen stötömhets över njurloger och ingen ömhet ovan symfyssen.

**Lab** Kan inte lämna urinprov, har inte kissat idag. CRP 15.

**BEDÖMNING/ÅTGÄRD** Misstänkt febril UVI. Har pigg hustru som kan köra honom till akutmottagningen på närmsta sjukhus.

**DIAGNOS ENL ICD-10** N109 Misstänkt febril UVI

## ”Facit” till Minifall Tecken på allvarlig infektion 1 a-c

### Minifall Tecken på allvarlig infektion 1 a – Benjamin 4 år

- Barn i alla åldrar med feber  $>41,0$  °C (hyperpyrexia) ger rött ljus (=hög risk) vid riskvärdering, därför borde Benjamin ha remitterats akut till sjukhus.
- Benjamin är trött, hängig men vaken. Han har inte orkat leka varför han har nedsatt aktivitetsnivå. Båda dessa ger gult ljus (=medelhög risk) vid riskvärdering.
- I åldersintervallet 2–5 år ger hjärtfrekvens  $>140$  gult ljus (=medelhög risk) vid riskvärdering. Ihållande takykardi och infektion kan vara tecken på septisk chock, myokardit, hypovolemi och smärta. Ihållande takykardi ger rött ljus (=hög risk) vid riskvärdering.
- När barn har förhöjd andningsfrekvens eller annan andningspåverkan är pulsoximetri (POX) indicerat. Även om andningsfrekvens  $<35$  i åldersintervallet 3–5 år ger grönt ljus vid riskvärdering har Benjamin varit tungandad, därför är det indicerat att mäta POX. En speciell barnsensor behövs. Normalvärde:  $\geq 95$  procent. Om upprepade POX visar  $\leq 92$  procent ska barnet skickas med akut transport till sjukhus och syrgas bör övervägas under resan. När en sjuk patient med förhöjd andningsfrekvens inte längre orkar andas snabbt går andningsfrekvensen ner och kan då bli normal trots allvarlig sjukdom. Detta kan upptäckas med hjälp av POX eftersom saturationen då sjunker.
- Även vid allvarlig infektion kan det dröja upp till 24 timmar från debut av symtom innan CRP stiger. Eftersom Benjamin varit sjuk kortare tid än ett dygn kan han ha en allvarlig bakteriell infektion trots att CRP är 18.

#### Åtgärder utifrån riskvärdering barn:

1. Ett ”rött symtom” räcker för rött ljus. Flertalet patienter med rött ljus remitteras akut till sjukhus.
2. Ett ”gult symtom” räcker för gult ljus. Kan åka hem med säkerhetsnät eller till sjukhus. Föranleder ibland remiss till barnakut eller handläggning i samråd med barnläkare. Ju fler ”gula ljus”, desto större skäl att remittera barnet akut till en barnklinik.
3. Grönt ljus: Kan åka hem, med eller utan behandling och med allmänna råd om att t.ex. ge vätska och smärtstillande läkemedel.

### Minifall Tecken på allvarlig infektion 1 b – Anders 66 år

- Frånvaro av feber hos äldre patient utesluter inte allvarlig infektion.
- Kräkningar kan vara ett symtom på pneumoni eller annan allvarlig infektion hos äldre.
- Hjärtfrekvens på 98 innebär ”gult ljus” = medelhög risk. Blodtryck bör kontrolleras, normalvärde  $>100$  systoliskt.
- Fråga om urinproduktionen, ej kissat på 12–17 timmar innebär ”gult ljus”.
- Andningsfrekvens på 26 innebär ”rött ljus” = hög risk. Hosta tillsammans med hög andningsfrekvens bör föranleda undersökning av saturation med POX, normalvärde  $\geq 96$  %.
- Även vid allvarlig infektion kan det dröja upp till 24 timmar från debut av symtom innan CRP stiger.
- Allvarlig komorbiditet innebär minst ett ”gult ljus”.
- Anders bör remitteras akut till sjukhus, eventuellt efter föregående kontakt med infektionsspecialist.

### Åtgärder utifrån riskvärdering vuxna:

1. Ett "rött symtom" räcker för rött ljus. Flertalet patienter med rött ljus remitteras akut till sjukhus.
2. Ett "gult symtom" räcker för gult ljus. Kan åka hem med säkerhetsnät eller till sjukhus. Ensamboende är ett observandum.
3. Grönt ljus: Kan åka hem, med eller utan behandling och med allmänna råd om att t.ex. ge vätska och smärtstillande läkemedel.

### Minifall Tecken på allvarlig infektion 1 c – Olof 82 år

- Förändrat beteende, blek hud och ingen säker urinproduktion senaste 18 h innebär var för sig "rött ljus" = hög risk. Misstänkt allvarlig infektion/sepsis.
- Andningsfrekvens och pulsoximeter bör kontrolleras.
- Eventuellt - förse Olof med syrgas (mål >94%), minst en perifer infart och intravenös vätska.
- Transportera Olof akut med prioriterad ambulans till sjukhus.
- Även vid allvarlig infektion kan det dröja upp till 24 timmar från debut av symtom innan CRP stiger.
- Statusmässiga fynd på febril UVI såsom stötömhet över njurloger förekommer mer sällan hos män. Detta kan bero på att infektionen endast engagerar prostata. Prostata borde palperas, men detta kan göras på sjukhuset. Om infektionen engagerar njurar hos små barn och äldre, både män och kvinnor, så signalerar inte detta alltid så tydligt i status.

Åtgärder utifrån riskvärdering vuxna: Se ovan.

### Referenser:

[Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård \(Regnbågshäftet\). Folkhälsomyndigheten](#)

[Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer om UVI i öppen vård 2017](#)