

Studieläkemedel i AsynjaVisph

Bakgrund


AsynjaVisph saknar möjligheten att ordinera studieläkemedel på ett enkelt sätt. Detta gör det svårt att tillhandahålla en komplett läkemedelslista till de som önskar en sådan, t ex kommunal hälso- och sjukvård. Det har därför kommit önskemål för att underlätta när detta är aktuellt.

Favoritordination


Dessa studier bedrivs på den egna enheten eller på en annan enhet. Om en annan enhet bedriver studien läggs studieläkemedlet in som en extern ordination. För att underlätta så har det tagits fram en gemensam favoritordination som kan användas för att ta fram en ordination som visar att patienten är ordinerad ett studieläkemedel. För att ordinera används ”Studieläkemedel” från Favoriter: Gemensamma/VGR REK/Studieläkemedel.

Användning av favoritordination

-Välj favorit ”Studieläkemedel”



-Välj aktuell dosenhet om annat är st.



-Välj aktuellt administreringsätt under ”Adm. väg”

Preparat (1 st) Studieläkemedel
Läkemedelsform
Styrka eller förpackning
Dosenhet * st
Tillverkare
Ta bort
 Blandning
Adm. väg: * Oralt
Adm. metod: Annat
Adm. tillfälle:
Instruktion för administrering:
Får ej bytas ut: Får ej dosdispenseras:

-Notera dosering

Onsdag 26 juni (Idag) | Välj ordinationstyp * | Doseringshjälp

- Ansvarig ordinator noteras, om det är en extern ordinator notera det.

Pat sköter själv adm.:
Ordinator: *
Extern ordination:
Extern ordination - Insättning av ordination gjordes utanför AsynjaVisph.
Insatt datum (ungefärligt): 2019-02-22
Extern ordinator (namn): Läkare Sten Stensson
OK
Avbryt

- I rutan ”Doseringsanvisning för recept” ska studiens namn, ev studiesubstans/er (om känt och relevant) samt styrka anges. Komplettera med adekvat dosering.

Doseringsanvisning för recept: Inkludera autotext:
Doseringsanvisning för recept
Studios namn
Studiesubstans/er
Styrka
Adekvat dosering
Ej godkänt läkemedel - Särskilda regler gäller

- Ordinationen gäller t.o.m noteras

Ord. gäller t.o.m. *
T.o.m: 2019-09-26 10:30
Tillsvidare:
Uts.orsak:

- Signera

Här nedan ser du en bild över hela ordinationen

Ordination -

Spara & Stäng Signera Signera & Recept Flera i följd Kopiera till ny Varning...

Preparat (1 st) Studieläkemedel Läkemedelsform Styrka eller förpackning Dosenhet * Tillverkare

Adm. väg: * Oralt Adm. metod: Annat Adm. tillfälle:

Instruktion för iordningställande: Instruktion för administrering:

Får ej bytas ut: Får ej dosdispenseras:

Onsdag 26 juni (Idag) Regelbunden Infoga dos Tillfällig dosändring Doseringshjälp

Adm. tid 08:00 Studieläkemedel, 1 st

Pat sköter själv adm.: Ordinator: * Extern ordination:

Doseringsanvisning för recept: Inkludera autotext: <1 på morgonen> Studiens namn: Stenis, Substans: Kromogram, Styrka: mg, Adekvat dosering: 1 tablett/dag i 3 månader

Ej godkänt läkemedel - Särskilda regler gäller

Ord. gäller fr.o.m. 2019-06-26 08:00 Beh.orsak: Mål: Nytt ställningstagande Datum: Ord. gäller t.o.m. * 2019-09-26 10:30 Tills vidare: Uts.orsak: Annan orsak, journalförs

Information
Överkänslighet
Ordinationer med liknande ATC-kod
Mätvärden
Ålder: 6 år Vikt: 20 kg 2019-01-11
Registrera
Framtida dosändringar

Genom att ange dessa uppgifter i doseringsanvisningen kommer dessa med på utskrift av patientens Medicinlista via fliken Läkemedelslista

Läkemedelsjournal -

Läkemedelslista Tidsoversikt Administrering Infusioner Alla läkemedel Receptförskrivning Vaccinationer

Preparatnamn	Läkemedelsform	Styrka	Dosering	Beh.orsak	Adm.instruktion	Typ	Receptdatum	Ord. gäller fr.o.m.	Ord. gäller t.o.m.	Uts.orsak	Signerad	Signerad av	Skapad på	Extern ordinator
Studieläkemedel	1 st					Rb	2019-02-22	2019-09-26	Annan orsak, journalförs	2019-06-26				Läkare Sten Stensson

Läkemedelsjournal -

Närhälsan Bergfot vårdcentral
VC vägen 1
52161 Stenstorp

Medicinlista
19-06-26

Utskriven: 2019-06-26 kl 10:49

Regelbundet

Gäller from	Gäller tom	Preparat	Behandlingsorsak	Dosering	Dosering	Doseringsanvisning	Ordinator
2019-06-26	2019-09-26	Studieläkemedel,		1 st	08:00 1 st	1 på morgonen Studiens namn: Stenis, Substans: Kromogram, Styrka: mg, Adekvat dosering: 1 tablett/dag i 3 månader	

-----slut utskrift-----