

LATHUND – Administrera infusioner

Denna lathund beskriver kortfattat olika funktioner vid administrering av infusioner.

Starta infusion

1. Klicka på **Väntande uppgift** i **Utdelningslista läkemedel**.
2. Ange **Administreringsställe**.
3. Klicka på **Verkställ**.
4. Signera.

Ändra hastighet

1. Klicka på Väntande uppgift i Utdelningslista läkemedel.
2. Ange ny hastighet.
3. Klicka på Verkställ.
4. Signera.

Dokumentera infusionsmängd eller bolusdos

1. Klicka på Väntande uppgift i Utdelningslista läkemedel.
2. Markera **Infunderat** längst till vänster i tabell.
3. Ange mängd i fältet för **Infusionsvolym (mL)**.
 - a. Bocka **Bolus** om det avser en bolusdos.
4. Klicka på Verkställ.
5. Signera.

Journalföring för: LÄKEMEDEL, HEBA

Ringer-Acetat Baxter Viaflo infusionsvätska, lösning Baxter Medical AB 1 000 mL
Ordningsorsak: Vätsketerapi, intravenöst, = 1 000 Totalvolym (mL): 1 000 mL, lösning, Hastighet: 100 mL/h

	2024-10-03 20:46 - 2024-10-04 20:46	
<input type="checkbox"/>	Starta påse	Påse nr1
<input type="checkbox"/>	Byt administreringsställe	Perifer venkateter (PVK)
<input checked="" type="checkbox"/>	Infunderat	
<input type="checkbox"/>	Bolus	
<input type="checkbox"/>	Ändra hastighet	100 mL/h 120 mL/h

Ja Nej Ringer-Acetat Baxter Viaflo infusionsvätska, lösning Baxter Medical AB 1 000 mL

*Infusionsvolym (mL): 145 Bolus

*Från: 2024-10-04 07:50

*Till: 2024-10-04 08:46

Infusionstid: 0 timmar 56 minuter

*Utförd av: Physician - Hospitalist Cemer Test

*Påse nr: 1

*Administreringsställe: Perifer venkateter (PVK)

Infunderat

Bearbetas

Figur 1. 1: Infunderat. 2: Infusionsvolym (mL) och Bolus. 3: Verkställ.

Avsluta infusion

1. Klicka på Väntande uppgift i Utdelningslista läkemedel.

2. Ange ny hastighet 0 mL/h.
3. Klicka på Verkställ.
4. Markera ruta för aktuell tid på raden för Infunderat och ange volym som infunderat.
5. Signera.

Journalföring för: LÄKEMEDEL, HEBA

Ringer-Acetat Baxter Viaflo infusionsvätska, lösning Baxter Medical AB 1 000 mL

Ordinationsorsak: Vätsketerapi, intravenöst, = 1 000 Totalvolym (mL): 1 000 mL, lösning, Hastighet: 100 mL/h

	2024-10-03 23:39 - 2024-10-04 23:39		
Starta påse	Påse nr1		
Byt administreringsställe	Perifer venkateter (PVK)		
Infunderat			0 mL/h
Bolus			
Ändra hastighet	100 mL/h	120 mL/h	0 mL/h

Ja Nej Ringer-Acetat Baxter Viaflo infusionsvätska, lösning Baxter Medical AB 1 000 mL

*Infusionsvolym (mL): Bolus

*Från: 2024-10-04 07:50

*Till: 2024-10-04 11:39

Infusionstid: 3 timmar 49 minuter

*Utförd av: Physician - Hospitalist Cemer Test

*Påse nr: 1

*Administreringsställe: Perifer venkateter (PVK)

Infunderat

Bearbetas

Figur 2. 1: Markera rutan för att ange infunderad mängd. **2:** Ange infusionsmängd som infunderat.

Om behandlingen skall avslutas får ordinationen avslutas via läkemedelslistan.

Påbörja ny infusion

1. Högerklicka på uppgift **Avsluta påse** i **Utdelningslista läkemedel**.
2. Välja **Starta ny påse**.
3. Ange hastighet.
4. Klicka på Verkställ.
5. Signera.