

LATHUND – Ordinera läkemedel för hemodialys med ordinationsplan

Hur man lägger läkemedelsordinationer för hemodialys med hjälp av ordinationsplanen NJUR Läkemedel vid hemodialys.

1. Sök fram ordinationsplanen **NJUR Läkemedel vid hemodialys**.
2. Har ordinationen lagts från arbetsflödet klicka ikonerna för **Ordinationer att signera** och välj **Ändra uppgifter**.
3. Ett fönster visas där du ska **Bekräfta fasåtgärd**.

Valen av **Åtgärd** att använda och välja mellan är:

- **Beställ för framtida besök** - används när ordinationerna ska aktiveras senare, till exempel för en kommande vårdhändelse.
- **Beställ nu** - används när ordinationerna ska bli aktiva direkt.

4. Klicka **OK**

Fas	Startdatum/tid	Åtgärd
NJUR Läkemedel vid hemodialys	*Ber. 2024-06-12 16:04	Beställ för framtida besök

Figur 1. **1:** Åtgärd **2:** OK

5. Ordinationsplanen öppnas, välj de läkemedel som ska ordineras.
6. Pilarna visar att det finns olika val för ordinationsinformationen, fyll i ytterligare nödvändig information för ordinationerna.
7. Lägg till ordinationer i fas om du behöver.
8. Signera genom Ordinationer att signera, Signera.

+ Lägg till | Dokumentera läkemedel efter historik | Avstämning | Kontrollera varningar

Avstämningsstatus
 Läkemedelshistorik | Inskrivning | Öppenvård

Ordinationer Läkemedelslista

+ Lägg till i fas 3 kontrollera varningar | Kommentar | *Ber. Start: 2024-06-12 15:44 | Behandlingstid: Ingen

	Status	Dosjus...	Information
NJUR Låken			
Läkemedel			
Antikoag			
<input type="checkbox"/>			
<input checked="" type="checkbox"/>			Ordinationsorsak: Blodförtunnande under dialysbehandling, intravenöst, 2 500 E, lösning, tillfällig ordination
<input type="checkbox"/>			Ordinationsorsak: Blodförtunnande under dialysbehandling, intravenöst, 3 500 E, lösning, tillfällig ordination
<input type="checkbox"/>			Ordinationsorsak: Blodförtunnande under dialysbehandling, intravenöst, 4 500 E, lösning, tillfällig ordination
<input type="checkbox"/>			Ordinationsorsak: Blodförtunnande under dialysbehandling, intravenöst, 10 000 E, lösning, tillfällig ordination
<input type="checkbox"/>			Ordinationsorsak: Blodförtunnande under dialysbehandling, intravenöst, 12 000 E, lösning, tillfällig ordination
<input type="checkbox"/>			Ordinationsorsak: Blodförtunnande under dialysbehandling, intravenöst, 10 000 E, lösning, tillfällig ordination
Epo			
<input checked="" type="checkbox"/>			Ordinationsorsak: För blodet, subkutant, 1 000 E, lösning, tillfällig ordination
<input type="checkbox"/>			Ordinationsorsak: För blodet, subkutant, 2 000 E, lösning, tillfällig ordination
<input type="checkbox"/>			Ordinationsorsak: För blodet, subkutant, 3 000 E, lösning, tillfällig ordination
<input type="checkbox"/>			Ordinationsorsak: För blodet, subkutant, 4 000 E, lösning, tillfällig ordination
<input type="checkbox"/>			Ordinationsorsak: För blodet, subkutant, 5 000 E, lösning, tillfällig ordination
<input type="checkbox"/>			Ordinationsorsak: För blodet, subkutant, 10 000 E, lösning, tillfällig ordination
<input type="checkbox"/>			Ordinationsorsak: För blodet, subkutant, 20 000 E, lösning, tillfällig ordination
Anemi			
<input type="checkbox"/>			Ordinationsorsak: Järnbrist, intravenöst, 100 mgFE, lösning, tillfällig ordination
<input type="checkbox"/>			Ges med olika intervall från 1 ggr /dialys tillfälle - 1 ggr /månad
<input type="checkbox"/>			Ordinationsorsak: Järnbrist, intravenöst, 200 mgFE mL, lösning, tillfällig ordination
<input type="checkbox"/>			I intervallet varje dialys- varannan månad. Späds enligt RSL
<input type="checkbox"/>			Ordinationsorsak: Anemi, oral, 50 mg, tablet, tillfällig ordination

Information

Diagnostabel | Ordinationer att kontrasignera | Spara som favorit

4 Ordinationer att signera

Figur 2. **1:** Ordination **2:** Ordinationsorsak. **3:** Lägg till fas. **4:** Ordinationer att signera