



LATHUND – Ordination av Oxytocin 8,3 mikrog i 500 mL natriumklorid 9mg/mL, titrerbar infusion, OB

1. Navigera till arbetsflödet **Förlossning**.
2. Klicka på komponenten **Ny ordination**.
3. Klicka på **Slutenvårdsordination**.
4. Sök efter Oxytocin infusion i sökfältet för att få fram tillgängliga alternativ.
5. Dubbelklicka på **Oxytocin 8,3 mikrog i 500 mL natriumklorid 9mg/mL, titrerbar infusion, OB**. Viktigt att välja denna ordination, då enbart denna kommer synas i **Interaktiv vy**.
6. Komplettera med obligatoriska uppgifter som längd och vikt vid behov.
7. Klicka på ikonen **Ordinationer att signera**.



Figur 1. 1: Förlossning. 2: Ny ordination. 3: Slutenvårdsordination. 4: Sök. 5: Dubbelklicka. 6: Ordinationer att signera.

8. Signera.



Figur 2. Signera.

För att se ordinationen

9. Klicka på **Interaktiv vy**.
10. Klicka på bandet **Förlossning**.
11. Klicka på sektionen **IV Drips**.
12. Ordinationen är synlig under IV Drips.

The screenshot shows a medical software interface with a menu on the left and a main content area. The menu has a red box labeled '1' around 'Interaktiv vy'. The main content area has a red box labeled '2' around 'Förlossning' and a red box labeled '3' around 'IV Drips'. Under 'IV Drips', there is a red box labeled '4' around a medication order: 'oxytocin 0,3 mikrogram/ml, infusion/flixtats titrerbar 0,3 mikrog [0,332 mikrog/h] = Natrumklorid...'. The order is listed with a 'Hastighet oxytocin' field.

Figur 3. **1:** Interaktiv vy. **2:** Förlossning. **3:** IV Drips. **4:** Ordination Oxytocin.