

LATHUND – Ordinera infusion från grunden

Infusioner i Powerchart har egenskapen kontinuerlig vilket innebär att behandlingen pågår tills vidare om inget annat anges. Ordinationen kan justeras så att behandlingen avslutas efter antal påsar, timmar, dygn med mera.

Det går att skapa egna infusioner med tillsatser om befintliga IV sets i ordinationsplaner eller fristående ej är lämpliga. Infusionsvolym och infusionstid beräknas efter produkttilldelning. Om automatisk produkttilldelning ej sker kommer totalvolym endast anges på baslösning utan hänsyn till eventuella tillsatser tills dess att farmaceutisk produkttilldelning utförs. Utgå därför i första hand från färdiga IV sets som du kan justera tid och hastighet på. IV set hittas i ordinationsplaner via den blå menyn Ordination lägg till eller via Läkemedel lägg till.

Det går inte att ordinera en infusion med administreringstillfällen som övriga läkemedel i Powerchart. Om en infusion skall administreras motsvarande en frekvens så som övriga läkemedel får det anges i fältet för **Ordinationskommentar**.

Ordinera infusion från grunden

1. Klicka på **Lägg till** vid **Läkemedel** i den blå menyn.
2. Sök och välj läkemedel som skall ordineras.
3. Lägg till tillsats om så önskas

Information om **kalciumklorid 2 mmol/ml, tillsats 20 mmol + Ringer-Acetat Baxter Viallo infusionsvätska, lösning Baxter Medical AB 1 000 mL**

Bastösning	Påsvolym	Hastighet	Infusionstid	
Ringer-Acetat Baxter Viallo infusionsvätska, lösning Baxter Medical AB 1000 mL		125 mL/h	8 h	
Tillsats	Tillsattdos	Justerad hastighet	Administrerar	Frekvens
kalciumklorid 2 mmol/ml, tillsats	20 mmol			Tillsats i varje påse
Infusionsvolym	1000 mL			

Vikt: 12 kg -> Klinisk vikt Resultatdatum/tid: 2024-08-30 14:16 Kroppytans area: 0,75 m²

4. Fyll i ordinationsdetaljer.

Information om **kalciumklorid 2 mmol/ml, tillsats 20 mmol + Ringer-Acetat Baxter Viallo infusionsvätska, lösning Baxter Medical AB 1 000 mL**

Styrka färdigpadd lösning: *Ordinationsorsak: test *Administreringsväg: intravenöst

*Läkemedelsform: lösning Fonda dos omedelbart: *Insättning: 2024-10-10 13:27

Administreringstillfällen: Behandlingstid: 2 Behandlingstid enhet: 8:00

Utsättning: 2024-10-11 09:36 Patientinstruktion: Permission:

Återinsatt efter permission: Ordinationsstid:

5. Försäkra att ovanstående information framkommer i ordinationskommentaren.

Ordinationer att signera

Ordinationsnamn	Status	Start	Information
Kontrakt: 42-2 Vårdhjälpnummer: MK000052245	Inskrivning: 2024-08-26 15:00		
Kaliumklorid 2 mmol/ml, tillsats 20	Ordinera	2024-10-10 08:23	Ordinationsorsak: test, intravenöst, Totalvolym (ml): 1 000 + 1 000 mL, lösning, Hastighet: 125 mL/h Administrera en påse om dagen med start kl 08:00 med infusionsid 8h.

Information om **kaliumklorid 2 mmol/ml, tillsats 20 mmol + Ringer-Acetal Baxter Viallo infusionsvätska, lösning Baxter Medical AB 1 000 mL**

Information | Information om kontinuerlig infusion | Ordinationskommentar | Diagnoser

Ordinationskommentar

Administrera en påse om dagen med start kl 08:00 med infusionsid 8h.

Utgå från värdet i rutan | Diagnostik | Ordinationer att kontrahera

Signera

6. Klicka på **Signera**.

Information om **kaliumklorid 2 mmol/ml, tillsats 20 mmol + Ringer-Acetal Baxter Viallo infusionsvätska, lösning Baxter Medical AB 1 000 mL**

Information | Information om kontinuerlig infusion | Ordinationskommentar | Diagnoser

Styrka färdigpadd lösning:

*Läkemedelsform: lösning

Administreringsfall:

Utsättning: 2024-10-11 08:23 09:36

Återinsatt efter permission:

*Ordinationsorsak: test

Första dos omedelbart:

Behandlingstid: 2

Patientinstruktion:

*Administreringsväg: intravenöst

*Insättning: 2024-10-10 13:37

Behandlingsid enhet: 125

Permission:

Ordinationsstid:

Utgå från värdet i rutan | Diagnostik | Ordinationer att kontrahera

Signera