


LATHUND – Administrering av smärtstillande ordination vid behov – utvärdering av smärteffekt

Administrering av smärtstillande ordination vid behov – utvärdering av smärteffekt


1. I **Utdelningslistan**, dubbelklicka på uppgiften för **Utvärdering**.



oxikodon (oxikodon 5 mg kapsel (oral)) Ordnationsorsak: Mot smärta, oral, 5 mg = 1 kapsel, kapsel, x2, Vid behov, PNI	Vid behov	5 mg Senast administrerat: 5 mg @ 2024-04-25 14:37	Utvärdering
oxikodon		* 5 mg Verifierat	
Utvärdering			

Figur 1. Utvärdering.

2. Fyll i formuläret.



Uppföljning läkemedelsadministrering - LÄKEMEDEL, TESTS

*Utförd: 2024-04-25 15:37

Interventionsinfo:
Valparameter: oxikodon
Utförd av: SSK, Cerner Cerner Test, 2024-04-25 14:37

Verktyg för smärta:
FLACC: oxikodon 5mg
NRSby Fan Scale: oralt, se Ordnationsorsak
COMFORT-B 9sk

Utvärdering läkemedelseffekt

Läkemedelseffekt ska utvärderas och smärtbedömning bör genomföras för läkemedel som ges vid behov i smärtindrande syfte

Läkemedelseffekt: Följd effekt
 Vis effekt
 Ingen effekt

Läkemedelseffekt, kommentar:

Bearbetas

Figur 2. Fyll i formulär.

3. Klicka på **Signera** för att signera ifylld dokumentation.