

Utbildning Millennium

Suicidriskbedömning

Följande aktivitet beskriver i punkt 1-3 hur du dokumenterar en suicidriskbedömning vid Psykiatrivksamhet samt kurator och psykolog inom somatik och primärvård.


Övriga verksamheter i VGR se punkt 4-6.

1. Välj aktuell patient. Navigera till komponenten **Suicidriskbedömning** i ditt arbetsflöde. Klicka på pilen neråt och sedan på **Suicidriskbedömning** för att öppna formuläret.

The screenshot displays the Millennium patient care system interface. The main window shows a patient overview for 'PSYK TESTPATIENT 6'. The left sidebar contains a navigation menu with 'Suicidriskbedömning' highlighted. The main content area shows a table of 'Suicidriskbedömning' records with columns for date, time, and risk level. A dropdown menu is open over the table, showing the 'Suicidriskbedömning' option selected. The bottom of the screen shows the system status and user information.

Figur 1. **1:** Arbetsflöde. **2:** Komponent Suicidriskbedömning. **3:** Nedåt pil. **4:** Knappen Suicidriskbedömning.

2. Fyll i obligatorisk och annan relevant information. Klicka sedan på signera formulär.



Figur 4. **1:** Tilläggsformulär. **2:** Suicidriskbedömning.

5. Fyll i obligatorisk och annan relevant information. Signera formuläret.

Suicidriskbedömning

Suicidförsök

	Datum	Tillvägagångssätt vid suicidförsök	Förlopp vid suicidförsök
Första suicidförsöket		<Multipla>	<Multipla>
Allvarligaste suicidförsöket		<Multipla>	<Multipla>
Senaste suicidförsöket		<Multipla>	<Multipla>

Närstående/vårdnadshavare närvarande? Ja Nej

Om nej, varför inte?

Klinisk bedömning av suicidrisknivå
 Detta steg genererar en KVÄ-kod

Låg risk
 Måttlig risk
 Hög risk

Låg risk: I planeringen av vården behöver beaktas att risken kan öka vid förändrad sjukdomsbild/livssituation
 Måttlig risk: Suicidrisken måste särskilt beaktas i planeringen av vården
 Hög risk: I normalfallet indikation för omedelbar vård med ställningstagande till tillsynsgrad. Akut behov av dygnet runt vård med hög tillsynsgrad. Om patienten inte accepterar inläggande vård ska vård enligt LPT övervägas

Kommentar till suicidriskbedömning

Vårdnadshavare bör vara delaktig vid framtagande av kris-/sakerhetsplan.


Kris- och säkerhetsplan upprättas Ja Nej

Kris- och säkerhetsplan upprättas, kommentar


Övriga vidtagna åtgärder, suicid

Figur 5. Tilläggsformulär Suicidriskbedömning.

6. Resultat från dokumentation återfinns dels i **Resultat, översikt** och som text i **Dokumentationskomponenten** i ditt arbetsflöde. Navigera till Meny och välj Resultat, översikt



Figur 6. Resultat, översikt i Blå Meny.



Figur 7. 1: Dokumentationskomponent 2: Suicidriskdokumentation