


Utbildning Millennium

Ordinationsmallar

Ordinationsmallar är mallar med fördefinierade värden till exempel ordinationsorsak, dos eller administreringstillfällen som används för att underlätta ordination av både läkemedelsordinationer och recept.


Genomför följande steg för att lägga en ordination med ordinationsmall:

1. I patientens journal, klicka på Ordinationer i den **Blå menyn** och därefter Läg till.




Figur 1. Ordinationer.

2. Välj typ av ordination i rullgardinsmenyn Typ.




Figur 2. Rullgardinsmeny för Typ av ordination.

3. Sök upp det läkemedel som ska ordineras i Sökfältet och klicka på det. Välj läkemedel med Ordinationsmall. Ordinationsmallarna visas intill läkemedlet med grå text inom parentes till exempel (oralt, 10 mg, tablett, x1).




Figur 3. **1:** Sök. **2:** Välj Ordinationsmall.

4. Värdena från ordinationsmallen (oralt, 10mg, tablett och x1) är förfyllda. Obligatoriska fält som ej är ifyllda visas i gult. Justera ordinationsdetaljer vid behov och fyll i obligatoriska fält.



Figur 4. Obligatoriska fält i gult.

5. Klicka på Signera för att signera ordinationen




Figur 5. Signera.

Ordinationsmall med Ordinationskommentar

För vissa läkemedel med ordinationsmall finns det en skriven ordinationskommentar, till exempel Späds enligt RSL, som ger sjuksköterskan eller farmaceuten information om hur beredningen av läkemedlet ska genomföras.

När läkemedlet har valts i ordinationsvyn, klicka på fliken Ordinationskommentar i ordinationsvyn för att se kommentaren. Klicka på Signera för att signera ordinationen.



Figur 6. **1:** Ordnationskommentar. **2:** Kommentarsfält **3:** Signera.


Filter för ordinationsmallar och andra sätt att avgränsa sökning vid ordination

För att underlätta och minska antalet sökträffar vid ordination filtreras ordinationsmallar automatiskt utifrån patientens ålder och i vissa fall patientens vikt. Det innebär att endast ordinationsmallar aktuella för patientens ålder och vikt visas.

Genom filtreringen genereras färre sökträffar. De filtrerade ordinationsmallarna kan ses som ett doseringsförslag baserat på patientens ålder som kan behöva justeras/anpassas. För att samtliga ordinationsmallar ska visas, inklusive ordinationsmallar till exempelvis för både vuxna och barn, kan filterfunktionen vid sökning väljas bort. Exempelvis kan filtreringen väljas bort vid ordination till en 17-åring patient för att visa ordinationsmallar även för vuxna.


Utför följande steg för att ta bort filterfunktionen vid sökning:

6. I Ordnationsvyn, klicka på Lägg till och välj typ av ordination i rullgardinsmenyn Typ.




Figur 7. **1:** Lägg till. **2:** Rullgardinsmeny för Typ av ordination.

7. Sök upp det läkemedel som ska ordineras i Sökfältet och klicka på ikonen Sök efter ytterligare objekt.



Figur 8. **1:** Sök upp läkemedel. **2:** Ikonen för Sök efter ytterligare objekt.


8. Fönstret för Sök efter ytterligare objekt visas och rutan för Filtrerade ordinationsmallar är markerad. Avmarkera rutan Filtrerade ordinationsmallar. Filtringen tas bort och alla ordinationsmallar som är tillgängliga för läkemedlet visas.



Figur 9. Filtrerade Ordinationsmallar avmarkerad.


Ordinera läkemedel med ordinationsmall från arbetsflödeskomponenten Ny ordination

9. Gå till arbetsflödeskomponenten Ny ordination.




Figur 10. Ny Ordination.

10. Sök upp det läkemedel som ska ordineras i sökfältet och klicka på läkemedlet. till exempel Rosuvastatin 5 mg tablet (oral) utan ordinationsmall.




Figur 11. Markera läkemedel att ordinerar.

- När ett läkemedel väljs utan ordinationsmall men mallar finns tillgängliga kommer fönstret Ordinationsmallar att öppnas. Användaren har möjlighet att välja ingen eller välja den ordinationsmall som finns tillgänglig.




Figur 12. Fönstret Ordinationsmallar

- Välj lämplig ordinationsmall och klicka OK.




Figur 13. 1: Välj Ordinationsmall 2: Knappen OK.

- Klicka på Ordinationer att signera.



Figur 14. Ordinationer att signera.

14. Klicka på Signera.



Figur 15. Signera.

15. Fyll i obligatoriska detaljer om detaljer saknas.

▼ Ordinationer att signera

Ordinationsnamn	Status	Start	Information
Kirurgisk akutvårdsavdelning Vårdhändelsenummer:MX000047714 Inskrivning: 2024-04-15 09:04			
Läkemedel			
rosuvastatin (rosuvast... Ordinera		2024-04-26 08:00	oralt, 5 mg, tablett, x1

▲ Information

1 obligatoriska värden saknas Diagnostabell Ordinationer att kontrasignera

Figur 15. Knappen om att obligatoriska värden saknas.

LÄKEMEDEL TEST3 PAIR16220110-9344 Konkvaligt Överenslighet: Ingen känd överenslighet VårdkontaktsID:MX000036776

Behandlingsåtgärdslogg: Inga data MRU:Neurologi-rehabiliteringslinn/Sadra Alvsborg Sja- Vårdfall: Somatik (In.datum: 2023-10-19 11:54 Ut.datum: <toget -- utskrivningsdatum) Plats: BUP Akutavdelning

Avstämningstatus: Läkemedelshistorik Inskrivning Utskrivning

Ordinationer Läkemedelslista Dokumentera i plan

Ordinationer att signera

Ordinationsnamn	Status	Start	Information
BUP Akutvårdsavdelning 41:1 VårdkontaktsID:MX000036776 Inskrivning: 2023-10-19 11:54			
Läkemedel			
rosuvastatin (rosuvast... Ordinera		2024-01-06 08:00	oralt, 5 mg, tablett, x1

Information om Fosuvastatin (rosuvastatin 5 mg tablett (oralt))

Information Ordinationskommentar Diagnostiser

Återstående administreringar: (Okant) Stopp: (Okant)

*Ordinationsorsak: [Gula fält]

Doc: 5 mg

*Administreringsförfäres: x1

Vid behov: Oralt

Vid behov mardot/dygn enhet:

Administreringstid enhet:

*Inskrivning: 2024-01-06 08:00

Utskrivning: [Gula fält]

*Administreringsväg: oralt

*Läkemedelsform: tablett

Vid behov: Ja Nej

Vid behov mardot/dygn:

Administreringstid:

Första dos omedelbart:

Behandlingstid:

Uppföljning: [Gula fält]

1 obligatoriska värden saknas Diagnostabell Ordinationer att kontrasignera Ordinationer för ssk-garskrivning Signera Avbryt

Figur 16. Obligatoriska värden som saknas indikeras av gula fält.

16. Klicka på Signera för att signera ordinationen.



Figur 17. Signera.



Information:

- Relevant information för vissa ordinationer kommer även finnas tillgängligt i ordinationsmallarna i form av en ordinationskommentar.
- När läkemedel ordinerar är rekommendationen att välja läkemedel med ordinationsmall om det finns tillgängligt, vilket innebär att du inte behöver ange varje värde separat. Det går fortfarande att ändra värdena innan ordinationen signeras.
- Genom att använda ordinationsmallar vid ordination kommer systemet lättare kunna tilldela en produkt till läkemedlet som ordinerar. Det vill säga att automatisk produkttilldelning förbättras av att använda ordinationsmallar vilket innebär att mindre arbete med manuell produkttilldelning.