



Utbildning Millennium

Övningsuppgifter Sjuksköterska slutenvård

Läkemedel

I följande övningsuppgifter kommer du att träna på att ordinera läkemedel med och utan kontrasignering och infusioner. Du kommer också träna på att iordningställa läkemedel, administrera läkemedel och ändra tid på läkemedelsadministration.

Övningsuppgift 1: Ordinerar läkemedel

1. Logga in i Journalen PowerChart
2. Klicka på Läkemedel + Lägg till
3. Sök upp Kapsel Oxynorm 5 mg och välj i listan
4. Sök upp läkare (tillexempel läkare, läkare) och ange Muntlig ordination som kommunikationstyp. Får du inte upp läkare direkt, gå in via förstoringsglasat och sök på nytt samt bocka ur rutan Visa endast aktiva patientrelationer.
Klicka på OK
5. Klicka på Klar
6. Ange Ordinationsorsak Smärta, Administreringsväg Oralt, Dos 5 mg (måste skrivas in manuellt i sökfältet), Läkemedelsform depotkapsel och Administreringstillfällen var 12:e timme (fast tid)
7. Ändra tid för första administrering genom att klicka på fältet Insättning
Klicka på Signera

Du har nu övat på att ordinera ett läkemedel som kräver kontrasignatur av läkare.

Övningsuppgift 2: Ordinerar läkemedel enligt Generella direktiv

1. Klicka på Ordinationer + Lägg till
2. Skriv Generellt direktiv i sökrutan och klicka på tangenten Enter

3. Välj generellt direktiv för din enhet och dubbelklicka
4. Sök efter namnet Läkare Läkare och använd kommunikationstyp Läkemedel generell ordination
Klicka på OK
5. Klicka på Klar
Du får nu upp en lista över de läkemedel som är möjliga att ordinera enligt generellt direktiv
6. Välj Paracetamol (Alvedon 500 mg filmdragerad tablett)
Klicka på Ordinationer att signera
7. Klicka på Signera
8. Uppdatera sidan
Du kan nu hitta det ordinerade läkemedlet i Utdelningslista, Iordningställande läkemedel och i listan över Aktuella ordinationer.

Du har nu övat på att ordinera ett läkemedel enligt generella direktiv.

Övningsuppgift 3: Ordinerar infusion

1. Lägg till Ringer-Acetat i Läkemedel.
2. Som ordinerande läkare kan du i denna övningsuppgift välja "Läkare, Läkare" och Kommunikationstyp Muntlig ordination.
3. Lägg till en tillsats genom att klicka på knappen Lägg till tillsats i ordinationsfältet
4. Sök och välj Kaliumklorid 2 mmol/ml, tillsats
5. Ange en dos med enhet efter i "tillsatsdos" och fyll i hastighet eller infusionstid

Påsvolym	Hastighet	Infusionstid
AB 1000 mL	125 mL/h	8 h
Tillsatsdos	Justerad hastighet	Administrerar
10 mmol		

6. Signera ordination

Övningsuppgift 4: Iordningställande av läkemedel

1. Navigera till Iordningsställande läkemedel via Blå Menyn så öppnas valt arbetsflöde. Kommer det i utbildningsmiljön upp ett felmeddelande, klicka på Avbryt.
2. I aktivitetslistan kan du se de läkemedel som finns för iordningställande. Ser du inga kan du utöka antalet söktimmar i "Visa" från 2 till 24.

3. För att se utökad information, klicka på läkemedlet så visas Aktivitetsinformationsrutan där bland annat du kan läsa Varningshistorik och se Ordinationskommentarer.
Stäng kommunikationsrutan med krysset.

4. Markera de läkemedel du vill iordningsställa
Klicka Nästa.
5. I rutan som visas ser du de läkemedel som inte är granskade av sjuksköterska (glasögonikon).
Klicka på Fortsätt
6. Klicka på Granska
7. Du kommer nu till vyn för Iordningsställande och läkemedlen du valt att iordningsställa visas i den vänstra sektionen Väntar på iordningställande. Till höger kan du se texten Skanna eller välj ett läkemedel för att starta. (I utbildningsmiljön har du inte tillgång till skanner/skrivare men bra att veta hur processen går till).

Du har nu övat på att iordningställa ordinerade läkemedel och du kan gå vidare med administrering.

Övningsuppgift 5: Ändra tid på läkemedelsadministration

1. Gå till Utdelningslista läkemedel
2. Högerklicka på läkemedelsuppgiften och klicka på Ändra administreringstid för dos
3. Ange ny tid. Klicka på OK

Du har nu övat på att ändra tid för läkemedelsadministration.

Övningsuppgift 6: Administrera läkemedel

1. Klicka på Läkemedel + Lägg till
2. Sök upp Kapsel Oxynorm 5 mg och välj i listan
3. Sök upp läkare (tillexempel läkare, läkare) och ange Muntlig ordination som kommunikationstyp. Får du inte upp läkare, läkare direkt g, gå in via förstoringsglasat och sök på nytt samt bocka ur rutan Visa endast aktiva patientrelationer.
4. Klicka på OK
5. Klicka på Klar
6. Ange Ordinationsorsak Smärta, Administreringsväg Oralt, Dos 5 mg (måste skrivas in manuellt i sökfältet), Läkemedelsform depotkapsel och välj tillfällig ordination.
7. Klicka på Signera
8. Klicka på läkemedelsadministrering i det gråa verktygsfältet
9. Skanna eller klicka på nästa om ej möjligt att skanna ID-band och välj "Går ej att skanna streckkod"
10. Skanna Oxynorm 5mg kapsel, alternativt bocka i aktuell ordination. Välj "går ej att skanna streckkod"
11. Klicka på signera.
12. Klicka på Utdelningslistan, välj "Alla läkemedel (System) och se din läkemedelsadministration.

