

# Utbildning Millennium

## Granska och använda neo-specifika läkemedelsordinationer/ordinationsmallar


Som stöd vid ordination av läkemedel till barn har det byggts ordinationsmallar för både ordination och recept inom slutenvård, öppenvård och primärvård. Ordinationsmallar är mallar med fördefinierade värden till exempel ordinationsorsak, dos eller administreringstillfälle. Ordinationsmallar för pediatrik ordination är baserade på ePed-instruktioner. När läkemedel ordineras är rekommendationen att välja läkemedel med ordinationsmall om det finns tillgängligt, vilket innebär att ordinatören inte behöver ange varje värde separat. Det går fortfarande att ändra värdena innan ordinationen signeras.

Länkar till ePed-instruktioner kan nås via funktionen Referensinformation som nås vid ordination, iordningsställande, administrering och i modulen Läkemedelsinformation. För att se mer detaljerad information kring ePed Rimlighetskontroll och länkar till ePed Instruktioner i Millennium se aktivitet ePed.

## Ordination med ordinationsmall


Genomför följande steg för att lägga en ordination med ordinationsmall:

1. I patientens journal, klicka på Ordinationer eller Läkemedel i den **Blå menyn** och därefter Lägg till.




Figur 1. Lägg till ordination. 1: Ordinationer. 2: Läkemedel. 3: Lägg till

2. Sök upp det läkemedel som ska ordineras i Sökfältet. Välj läkemedel med Ordinationsmall. Ordinationsmallarna visas intill läkemedlet med grå text inom parentes till exempel (oralt, 15 mg/kg, granulat för beredning).



Figur 2. Välj läkemedel. **1:** Sökruta. **2:** Lista med sökresultat.

3. Om en ordinationsmall med förifylld dos väljs kommer doskalkylatorn att öppnas automatiskt. I doskalkylatorn finns det möjlighet att ändra måldos i fältet Måldos för att få en ny Beräknad dos. Klicka på Tillämpa dos.



Figur 3. Doskalkylatorn

4. Värdena från ordinationsmallen är förifyllda i ordinationsfältet. Obligatoriska fält som ej är ifyllda visas i gult. Justera ordinationsdetaljer vid behov och fyll i obligatoriska fält.

The screenshot shows a prescription form for Amoxicillin 50 mg/ml granulat för beredning (oralt). The form includes fields for Administrationssak (Antibiotika), Administrationsväg (oralt), Dos (157,5 mg), and Administrationstillfällen. Several fields are highlighted in yellow, indicating they are mandatory. The form also includes a 'Signera' button at the bottom right.

Figur 4. Obligatoriska fält i gult.

Doskalkylatorn kan även öppnas från ordinationsvyn genom att klicka på ikonen Dosklakylatorn.

This screenshot is similar to Figure 4, but it highlights the 'Doskalkylatorn' icon (a calculator icon) in the top left corner of the form, indicating how to access the dosage calculator.

Figur 5 Ikon för doskalkylering

## 5. Klicka på Signera för att signera ordinationen

This screenshot shows the 'Ordnationer att signera' section at the top, listing the current prescription. Below it, the 'Information om amoxicillin' form is shown. The 'Signera' button at the bottom right of the form is highlighted with a red box, indicating the next step in the process.

Figur 6. Signera.

## Ordnationsmall med Ordnationskommentar

För vissa läkemedel med ordinationsmall finns det en skriven ordinationskommentar, till exempel måldos för läkemedlet, som ger sjuksköterskan eller farmaceuten information om doseringen av läkemedlet.

När läkemedlet har valts i ordinationsvyn, klicka på fliken Ordnationskommentar i ordinationsvyn för att se kommentaren. Klicka på Signera för att signera ordinationen.

Ordinationsnamn	Status	Start	Information
Kirurgjävdelning; IV; 1 Vårdhändelsenummer:MX000035659 Inskrivning: 2023-09-04 21:57			
Läkemedel			
amoxicillin (amoxicillin 50 mg/ml granulat för...	Ordinera	2024-06-13 14:00	Ordinationsorsak: Antibiotika, oralt, 157,5 mg, granulat för beredning, x3, 2024-06-13 10:40 Måldos: amoxicillin 50 mg/ml granulat för beredning (oralt) 15 mg/kg 2024-06-13 10:43

**Information om amoxicillin (amoxicillin 50 mg/ml granulat för beredning (oralt))**

Information   Ordinationskommentar   Diagnoser

Ordinationskommentar

Måldos: amoxicillin 50 mg/ml granulat för beredning (oralt) 15 mg/kg 2024-06-13 10:43

0 obligatoriska värden saknas   Diagnostabell   Ordinationer att kontrastigera   Signera

Figur 7. **1:** Ordinationskommentar. **2:** Kommentarsfält **3:** Signera.

!

**Information:**

- Relevant information för vissa ordinationer kan även finnas tillgängligt i ordinationsmallarna i form av en ordinationskommentar.
- När läkemedel ordineras är rekommendationen att välja läkemedel med ordinationsmall om det finns tillgängligt, vilket innebär att du inte behöver ange varje värde separat. Det går fortfarande att ändra värdena innan ordinationen signeras.
- Genom att använda ordinationsmallar vid ordination kommer systemet lättare kunna tilldela en produkt till läkemedlet som ordineras. Det vill säga att automatisk produkttilldelning förbättras av att använda ordinationsmallar vilket innebär att mindre arbete med manuell produkttilldelning.
- För att underlätta och minska antalet sökträffar vid ordination filtreras ordinationsmallar automatiskt utifrån patientens ålder och i vissa fall patientens vikt. För att samtliga ordinationsmallar ska visas kan filterfunktionen vid sökning väljas bort. Se mer detaljerad information om detta i aktiviteten Ordinationsmallar.