

Övningsuppgifter Millennium

Läkemedel

Ordinera läkemedel

1. Klicka på Läkemedel + Lägg till
2. Välj Öppenvårdsordination
3. Sök upp desloratadin 5 mg och välj läkemedel med mall
4. Ändra ordinationsorsak
5. Ändra tid för första administrering genom att klicka på fältet Insättning
6. Ange obligatorisk information och klicka på signera

Ordinera infusion

7. Sök upp och välj Ringer-Acetat
8. Som ordinerande läkare kan du i denna övningsuppgift välja "Läkare, Läkare" när du söker efter denna läkare är det viktigt att du bockar ur rutan att bara söka efter personer med tilldelad vårdrelation.
9. Lägg till en tillsats genom att klicka på knappen Lägg till tillsats i ordinationsfältet
10. Sök och välj Kaliumklorid 2 mmol/ml, tillsats
11. Ange en dos i "tillsatsdos" och fyll i hastighet eller infusionstid

Påsvolym	Hastighet	Infusionstid
AB 1000 mL	 125 mL/h	8 h
Tillsatsdos	Justerad hastighet	Administrerar
10 mmol		

12. Signera ordination

Recept

13. Från arbetsflöde Öppenvård klicka på komponenten Ny ordination
14. Säkerställ att Receptförskrivning är markerad
15. Sök upp rosuvastatin och välj läkemedel med mall
16. Välj en förpackning
17. Klicka på signeringskorg och klicka på signera ordination



Övningsuppgifter Millennium

18. Fyll i obligatorisk information och i utbildningsdomänen väljer du i rutan “Skicka till” - “Skicka inte: annan orsak” och signera. I utbildningsdomänen finns inga apotek att skicka receptet direkt till.

ePed

19. Klicka på Läkemedel i blå menyn och sök fenoximetylpenicillin 100 mg/ml (oralt) och välj mall
20. Öppna ePed länk genom att högerklicka på läkemedlet och välj Referensinformation
21. Gå tillbaka och öppna doskalkylatorn och ange 12,5 mg/kg
22. Välj tillämpa dos
23. Ange x3 i Administreringstillfällen, 10 dygn i Behandlingstid och Typ av behandling Akut
24. Fyll i övriga obligatoriska fält och signera