

# LATHUND – Starta infusion av Oxytocin 8,3 mikrog i 500 mL natriumklorid 9mg/mL, titrerbar infusion, OB


1. Navigera till interaktiv vy för att starta infusion av **Oxytocin 8,3 mikrog i 500 mL natriumklorid 9mg/mL, titrerbar infusion, OB**,
2. Välj bandet Förlossning
3. och rubrik IV drips.
4. Infusion Oxytocin visas i fältet.
5. Dubbelklicka på dokumentationsfältet för Oxytocin.

The screenshot shows the 'Interaktiv vy' window with a left-hand menu and a main content area. The menu on the left has 'Interaktiv vy' highlighted with a red circle and the number 1. The main content area has 'Förlossning' selected with a red circle and the number 2. Under 'Förlossning', 'IV Drips' is selected with a red circle and the number 3. In the 'IV Drips' list, the entry 'oxytocin 8,3 mikrog/mL, infusion/titrerbar 8,3 mikrog [0,332 mikrog/h] - Natriumklorid...' is highlighted with a red circle and the number 4. To the right of this entry, the field 'Hastighet oxytocin' is highlighted with a red circle and the number 5.

6. Ruta farmaceutisk verifiering kommer upp. Denna ruta kommer upp tills farmaceut har verifierat generellt.
7. Tryck ja.

The screenshot shows the same 'Interaktiv vy' window as above, but with a dialog box open. The dialog box is titled 'Farmaceutisk verifiering' and has a yellow warning icon. The text inside the dialog box reads: 'oxytocin 8,3 mikrog/mL, infusion/titrerbar 8,3 mikrog [0,332 mikrog/h] - Natriumklorid... har inte verifierats. Fortsätt?'. Below the text are two buttons: 'Ja' and 'Nej'. The 'Ja' button is highlighted with a red circle and the number 7. The dialog box title is highlighted with a red circle and the number 6.

8. Fyll i nödvändig information såsom hastighet, volym och vilken påse.
9. Signera.



- 10. I hemvy, kvinnohälsa syns nu,
- 11. i arbetsflödet Partogram,
- 12. komponent Partogram, översikt
- 13. att infusion Oxytocin har startats.

