

# LATHUND – Använda patientens egna läkemedel

## Tillämplig yrkesroll: Läkare slutenvård

Använd denna arbetsbeskrivning när du önskar ange om patientens medhavda läkemedel skall användas vid administrering.

1. Öppna patientens journal och navigera till vyn för att ordinera läkemedel.
2. Sök upp aktuellt läkemedel och fyll i ordinationsdetaljer. Markera **Ja** i valet för Använd patientens egna läkemedel.
3. **Signera** ordination.

Information om **citalopram (citalopram 10 mg tablett (oralt))**

Information | Ordinationskommentar | Diagnoser

Återstående administreringar: (Okänt) Stopp: (Okänt)

\*Ordinationsorsak: test

\*Läkemedelsform: tablett

Vid behov Orsak:

Administreringstid:

\*Insättning: 2024-10-03 08:00

Uppföljning: \*\*\*\*

Självadministrering:  Ja  Nej

Återinsatt efter permission:

Ordinationsstöd:

\*Administreringsväg: oral

\*Administreringstillfällen: x1

Vid behov maxdos/dygn:

Administreringstid enhet:

Behandlingstid:

Patientinstruktion:

Avstå slutenvårdsdos:  Ja  Nej

\*Dos: 10 mg

Vid behov:  Ja  Nej

Vid behov maxdos/dygn enhet:

Första dos omedelbart:

Utsättning: \*\*\*\*

Använd patientens egna läkemedel:  Ja  Nej

Permission:

Läkemedelsnamn exempel:

0 obligatoriska värden saknas | Diagnostabell | Ordinationer att kontrollera

3 Signera

Figur 1. Ordinationsfält för ordination. **2:** Använd patientens egna läkemedel **3:** Signera