

Lokal smärtlindring

Produkt	Användning - Spray, gel, kräm eller salva som läggs på såret/ sårkanter för att minska patientens smärtupplevelse innan rengöring. Läkarordination. Övrig information se FASS.
Xylocaingel 2%	Applicera på en våt kompress, som sedan lägges över såret. Effekt efter ca 5-10min. Effekten kvarstår i ca 20-30minuter. Max 20g per dygn.
Xylocain kutan spray 100mg/ml	Spraya på sårytan. Effekt efter 1-5 minuter. Effekten kvarstår i ca 10-15 minuter. Kan svida på såret initialt. Max 20 doser per dygn.
Xylocainsalva 5%	Applicera på en våt kompress, som sedan lägges över såret. Effekt efter ca 5-10min. Effekten kvarstår i ca 20-30minuter. Max 10g per dygn.
Emlakräm 25mg/g+25mg/g	Läggs på sårkanter/hud minst en timme före rengöring. Lägg ett täckförband över, ex filmförband. Om krämen sitter på under 1-2 timmar varar bedövningen cirka två timmar efter det att täckförbandet tagits bort. Max 10g per dygn.
Morfingel 1mg/ml	Används på mycket smärtsamma sår / inflammerad hud. Appliceras på såret ca 15min innan rengöring för smärtlindring inför detta. Våta urkramade kompresser över gelen. Applicera innan påtagning av nytt förband för smärtlindrande effekt över tid. Kan ha effekt under 12-48h. OBS ev minska annan smärtlindring om god effekt. Blanda själv ->1ml inj Morfin 10mg/ml, + 10g Instrasite gel. Öka/ minska mängden Morfin för ökad/ minskad koncentration.