



Lutningstest (TILT-test)

Lutningstest genomförs vid utredning av svimningar.

Först kommer du att få ligga och vila i några minuter på lutningsbritten. Vi kommer att koppla på EKG, blodtrycksmanschett och blodtrycksmätning på fingret. Efter en stunds vila reser vi upp britten till 70 graders lutning. Vi kommer att mäta ditt blodtryck och EKG kontinuerligt under testet. Om inga symtom uppkommit efter 10 minuters lutning kommer vi i vissa fall ge dig en spraypuff med nitroglycerin (kärilvidgande medicin) under tungan och sedan får du fortsätta stå i upp ytterligare 10 minuter eller tills svimning eller andra påtagliga symtom inträder.

Biomedicinsk analytiker är med under hela testet och du får också träffa en läkare.

Förberedelser: Du ska vara fastande (inte äta eller dricka) 4 timmar innan undersökningen, samt inte ha druckit kaffe eller energidryck samma dag.

Tidsåtgång: cirka 2 timmar.

Kontaktuppgifter

Har du frågor är du välkommen att ringa Klinisk fysiologi.

Telefontid: måndag-fredag 09:00-10:00

Telefonnummer: 033 – 616 25 36

1177 – tryggt om din hälsa och vård

På 1177.se kan du få mer information om sjukdomar, undersökningar, behandlingar och läkemedel samt få råd om hälsa. Du kan även läsa din journal och göra dina vårdärenden. Ring telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt. www.1177.se