



## Information inför operation i lokalbedövning

- Duscha eller bada innan besöket. Ta på dig rena kläder.
- Beräknad besökstid är 45 minuter.

### Om du äter vissa läkemedel

- Läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra och andra antiinflammatoriska läkemedel ökar risken för blödning i samband med operation. Ta inte dessa läkemedel i smärtstillande syfte veckan före din operation.
- Är du ordinerad Trombyl ska du fortsätta äta tablettorna enligt ordination.
- Om du tar Plavix, Brilique eller Clopidogrel sätts det ut **5 dygn innan** operationen.
- Om du tar Eliquis, Pradaxa eller Xarelto sätts det ut **2 dygn innan** operationen.

### Om du är rökare

Om du är rökare rekommenderar vi dig att göra uppehåll med rökningen. Se vår hemsida: [www.sas.vgregion.se/patient-hos-oss/din-halsa/levnadsvanor-vid-operation](http://www.sas.vgregion.se/patient-hos-oss/din-halsa/levnadsvanor-vid-operation)

### Om du har sår, rivmärken, torrsprickor

Om du har något av detta på armen och/eller i närheten av operationsområdet, kontakta oss snarast på telefon 0320-77 91 54 för vidare information! **Se exempelbilder på nästa sida.**

OBS! Tag inte bort något hår intill/i operationsområdet.

**För att minska risk för postoperativ infektion i operationsområdet gäller nedanstående:**

- Huden på handen och dess närhet (underarmen) ska var fri från sår/annan påverkan. Dit räknas till exempel skavsår/rivsår, svampinfektion, brännsår, böld/finne, eksem och insektsbett. **Se exempelbilder nedan.**
- Du ska heller inte ha en pågående hudinfektion på annan del av kroppen.
- Du ska inte ha en nyligen genomgången, eller pågående, tandbehandling.
- Vid operation på handen/fingrarna ska du inte ha nagellack, lösnaglar, nagelförlängningar, gelenaglar eller andra konstgjorda/uppbyggda naglar. Om sådana används/finns ska de avlägsnas hemma innan operationen, minst en vecka före operation.



*Exempel på sår och annan påverkan som inneburit att operation ej kan genomföras.*