



Gastroskopi – undersökning av magsäcken i narkos

Vad innebär en gastroskopi?

Gastroskopi är en undersökning där ett böjligt instrument med en diameter på ungefär 9 mm och en kamera i spetsen förs ner i magsäcken genom munnen. Genom instrumentet kan den som utför undersökningen titta på slemhinnan i matstrupen, magsäcken och övre delen av tolvfingertarmen och även ta vävnadsprover för mikroskopisk undersökning.

Hur går undersökningen till?

Instrumentet förs in genom munnen, ner i svalget och in i matstrupen. Samtidigt blåses luft in för att magslemhinnan och eventuella förändringar ska kunna ses bättre. Rapning efter undersökningen är därför vanligt men ofarligt. Vid undersökningen tas ibland vävnadsprover från slemhinnan med en liten tång, vilka skickas för mikroskopisk analys. Det tar ungefär 4 veckor att få svar på dessa prover.

Hela undersökningen brukar ta cirka 5-10 minuter.

Förberedelser

När du kommer till endoskopienheten informerar och förbereder en sjuksköterska dig. Du får också träffa den läkare/sjuksköterska som ska undersöka dig.

Du kommer att sövas (få narkos) vid undersökningen och får därför en nål insatt i ett kärl på handryggen eller i armvecket. Barn får först en salva med lokalbedövning på huden, alternativt sövs med sovgas via en mask över näsa/mun, inför att nålen ska sättas. Via nålen ges sedan läkemedel/sömnmedel under undersökningen.

Magsäcken måste vara tom vid undersökningen.

Du får inte äta fast föda **efter klockan 24:00** dagen före undersökningen. Det går bra att dricka klara drycker som vatten, sportdryck, buljong

(innehåller salt), juice utan fruktkött, saft, kaffe eller te utan mjölk fram till 2 timmar före din bokade tid.

Att tänka på!

- Du ska ha lämnat in en hälsodeklaration inför undersökningen. Det är viktigt att du uppger om du är överkänslig mot några läkemedel.
- Lämna värdesaker och smycken hemma.
- Piercing i näsa och mun ska tas bort. Ta även bort nagellack och smink.
- Du får inte köra bil, cykla eller framföra annat fordon på undersökningdagen, eftersom din reaktionsförmåga blir nedsatt av de mediciner du får vid undersökningen.
- Du ska inte vara ensam under det första dygnet efter att du varit sövd.
- Är du i behov av tolk, kontakta endoskopimottagningen.
- Om du är rökare rekommenderar vi dig att göra ett uppehåll, eller sluta med rökning! Se folder "[Rökfri och alkoholfri inför och efter operation](#)", alternativt information på webbplatsen www.1177.se/Vastra-Gotaland/levnadsvanor-operation
- Tag gärna med något att läsa eller lyssna på. Ibland kan väntetiden bli längre än planerat.

Hur gör jag med mina mediciner?

Om du använder mediciner för Parkinson eller epilepsi tar du dina mediciner som vanligt, men inte de närmaste 2 timmarna före undersökningen. Är du insulinbehandlad diabetiker och har frågor om detta, kontakta din diabetessköterska eller din vårdcentral.

Exenatid, Liraglutid, Lixisenatid, Dulaglutid, Semaglutid (t.ex. Ozempic eller Rybelsus) ska inte tas under 2 veckor före undersökningen.

Blodförtunnande medicin

Har du behandling med blodförtunnande läkemedel (förutom Trombyl) ska du kontakta endoskopienheten på telefon **033-616 19 73** minst en vecka innan undersökningen. De vanligaste blodförtunnande läkemedlen är Apixaban (t.ex. Eliquis), Edoxaban (t.ex. Lixiana), Rivaroxaban (t.ex. Xarelto), Dabigatran (t.ex. Pradaxa), Ticagrelor (t.ex. Brilique), Clopidogrel (t.ex. Plavix), Prasugrel (t.ex. Efient), Waran och Fragmin.

Om du behandlas med Waran ska du även kontakta din AK-mottagning senast en vecka före undersökningen.

Pacemaker eller ICD

Har du en pacemaker eller ICD, informera personalen på endoskopimottagningen om detta när du kommer på ditt besök.

Smittsamma sjukdomar

Har du leverinflammation (hepatit) av smittsam typ, aktiv tuberkulos, kronisk salmonellainfektion, HIV-infektion eller AIDS täcker våra hygieniska åtgärder rutinmässigt detta. Tala dock om detta när du kommer, kanske har din behandlande läkare av sekretesskäl inte angivit detta på remissen.

Besök på uppvakningsenheten

Med hänsyn till patientsäkerhet och integritet vill vi minimera antalet besökare på vår uppvakningsenhet. Om särskilda behov finns försöker vi naturligtvis tillgodose dessa.

En förälder till barn är välkomna, däremot har vi inga möjligheter att låta syskon följa med.

Vad händer efter undersökningen?

Du får stanna kvar på vår uppvakningsavdelning cirka 1 timme för observation, eftersom du fått sömnmedel vid undersökningen. När du vaknat upp får du äta och dricka som vanligt.

Du får inte köra bil, cykla eller framföra annat fordon hem på grund av de mediciner du får vid undersökningen. Det är därför bra om någon kan hämta dig på sjukhuset. Du bör inte vara ensam under det första dygnet efter att du varit sövd.

Efter avslutad undersökning får du som regel ett preliminärt svar. Tas vävnadsprov vid undersökningen skickas dessa på analys. Det tar vanligtvis ungefär 4 veckor att få svar på dessa. Resultatet meddelas till din ordinarie läkare som i sin tur meddelar dig svaret.

Prover i vården sparas

När du lämnar prov i vården kan vissa prov komma att sparas i en biobank. Läs mer om biobankslagen på 1177.se och biobanksverige.se.

Kontaktuppgifter

För medicinska frågor inför undersökningen samt ombokning tar du kontakt med endoskopienheten på telefon **033 – 616 19 73** helgfri måndag-torsdag 08:00-09:30 samt 13:30-15:00.

Om du får komplikationer, kontakta i första hand endoskopienheten på telefon **033 – 616 33 77**, måndag-torsdag 8:00-16:00, fredag 8:00-13:30.

Kvällar/helger kontaktar du sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer **1177** eller din närmaste akutmottagning.