

Information inför pricktest

Vi har reserverat tid för pricktest på dig enligt bifogad kallelse.

Pricktest är en undersökningsmetod för utredning av allergibesvär. Pricktestreaktionen är beroende av hudens känslighet för histamin.

- Det är därför viktigt att du inte använder mediciner som kan påverka histaminkänsligheten (se nedan).
- Smörj inte armarna med någon form av hudkräm och sola inte armarna 3 dygn före testet.
- Om du duschat/badat, se till att inga rester av schampo eller tvål finns kvar på huden.

Nedanstående läkemedel får inte tas inför pricktestning:

Antihistamin Aerius, Cetirizin, Clarityn, Loratadin, Tavegyl, Zyrlex, Kestine med flera
Sätts ut 5 dygn före test.

Kortisonpiller Testet bör inte utföras inom 5 dagar efter avslutad kortisonkur. Vid långtidsbehandling med kortison <10 mg Prednisolon/dag kan testet utföras som vanligt.

Kortisonkräm Utsättes 10 dagar före test på underarmar.

Antidepressiv tablett Kontakta oss om du använder några läkemedel inom denna grupp.

Är du osäker angående någon medicin, kontakta oss på telefon **033 – 616 14 66**, telefontid måndag – fredag 11:00-12:00.

Välkommen!

Med vänlig hälsning

Allergimottagning
Södra Älvsborgs Sjukhus Borås