



# Information inför provokation på allergimottagning

För att kunna testa eventuell allergi/överkänslighet behöver det ofta göras en försiktig provokation med det misstänkta ämnet via injektionsspruta eller genom att svälja ämnet. Vid eventuell allergi/överkänslighet kan du således komma att reagera med allergisk reaktion.

## Förberedelser inför provokation

- Provokationen kommer att ta 4–6 timmar. Under denna tid får du inte lämna mottagningen.
- Ha gärna på din mobiltelefon före och efter provokationen om vi skulle behöva nå dig.
- Du ska ha ätit en vanlig frukost före provokationen, men undvik kaffe denna dag.
- Ta med något att äta under dagen.
- Om du tar allergitablett ska den sättas ut **5 dagar före** besöket.
- Medicinerar du med NSAID (t.ex. Ipren/Ibuprofen, Diklofenak, ASA), antidepressiva-, blodtrycks-, eller kortison-tabletter, antibiotika, sömnablett, epilepsimedicin, astma/KOL-inhalationer eller är osäker angående någon medicin, kontakta oss på Allergimottagningen på telefonnummer 033-616 14 66.
- Du kommer eventuellt att försees med en intravenös nål (akutberedskap).

Välkommen!

Allergisköterska  
Malin Maltesson

Allergiöverläkare  
Dan Weinfeld