

Laboratorium för Klinisk patologi

Remitterande vårdenhet (HSA-ID)	Personnummer och namn
Provtagare (HSA-ID)	Provtagningsdatum
<input type="checkbox"/> <b>SNABBSVAR</b> <input type="checkbox"/> <b>SVF</b>  <b>Tfn</b> .....	Plats för laboratoriets etikett

<b>PROVTYP (ett alternativ)</b> 254 <input type="checkbox"/> HPV-analys 256 <input type="checkbox"/> HPV-analys och cytologisk analys (dubbelanalys) 255 <input type="checkbox"/> HPV-analys med cytologisk analys om positiv för HPV (reflexcytologi)	<b>INDIKATION FÖR PROVTAGNING (ett alternativ)</b> 225 <input type="checkbox"/> Screening 48 <input type="checkbox"/> Symtom 49 <input type="checkbox"/> Kontroll/utredning av avvikande prov 51 <input type="checkbox"/> Peroperativ cervixdiagnostik 54 <input type="checkbox"/> Uppföljning av invasiv cancer
<b>TOPOGRAFI (ett eller flera alternativ)</b> 212 <input type="checkbox"/> Fullständigt prov (2 portioner) 252 <input type="checkbox"/> Portio 213 <input type="checkbox"/> Vagina 218 <input type="checkbox"/> Endocervix 219 <input type="checkbox"/> Annat	Uppföljning efter dysplasibehandling 52 <input type="checkbox"/> < 2 år efter behandling 53 <input type="checkbox"/> ≥ 2 år efter behandling
<b>ANAMNES</b> 201 <input type="checkbox"/> Senaste mens (mdd) ..... 202 <input type="checkbox"/> Gravid (vecka) ..... 203 <input type="checkbox"/> Partus (åmmdd) .....  220 <input type="checkbox"/> Pågående cytostatikabehandling ..... 57 <input type="checkbox"/> Tidigare strålbehandlad ..... 221 <input type="checkbox"/> Tidigare total hysterektomi 204 <input type="checkbox"/> Menopaus 205 <input type="checkbox"/> Hormonbehandling i/efter klimakteriet 246 <input type="checkbox"/> Blödningsrubbnig 247 <input type="checkbox"/> Kontaktblödning 248 <input type="checkbox"/> Mellanblödning 249 <input type="checkbox"/> Postmenopausal blödning	<b>STATUS</b> 59 <input type="checkbox"/> Blödning 207 <input type="checkbox"/> Spiral  Kolposkopiutfall: 28 <input type="checkbox"/> Ej utförd 29 <input type="checkbox"/> Normal 240 <input type="checkbox"/> Låggradig atypisk 241 <input type="checkbox"/> Höggradig atypisk 66 <input type="checkbox"/> Typ av TZ, 1-3 ..... 67 <input type="checkbox"/> Swede score, 0-10 p ..... 224 <input type="checkbox"/> Cervicit/Avvikande flytning 64 <input type="checkbox"/> Atrofi
<b>ÖVRIGT</b> 216 <input type="checkbox"/> Px taget vid undersökningen	<b>Ev. kommentar</b>

Under rubriken Indikation ska alltid ett och endast **ett** alternativ markeras med kryss.  
Under rubrikerna Topografi, Anamnes och Status ska **ett eller flera** alternativ markeras.

<b>Screening</b>	Prov tas från symtomfri patient som inte ingår i särskilt uppföljningsprogram på gynnottagning. Bör endast tas som s.k. kompletterande screening
<b>Symtom</b>	Prov tas från patient p.g.a. symtom eller makroskopiska fynd (som specificeras under rubrikerna Anamnes och Status på remissblanketten), främst som del i undersökning för att utesluta invasiv, symtomgivande cervixcancer
<b>Kontroll/utredning av atypi</b>	Prov tas som led i utredning av tidigare påvisad atypi, som (ännu) inte har föranlett behandling
<b>Uppföljning av obedömbart prov</b>	Nytt prov tas därför att föregående prov inte hade tillfredsställande bedömbarhet vid laboratoriet
<b>Peroperativ cervixdiagnostik</b>	Cytologiskt prov tas för diagnostik av ev. kvarvarande förändringar i endocervix efter dysplasi behandling. Ersätter därmed cervixabrasio
<b>Senaste mens</b>	Senaste menstruationens första dag
<b>Gravid vecka</b>	Patienten är gravid. Antalet veckor kan valfritt vara ingångna veckor eller fullbordade veckor
<b>Partus</b>	Ifylls om patienten har fött barn senaste året
<b>Menopaus</b>	12 månaders frånvaro av menstruation hos kvinna i klimakterieåldern
<b>Hormonbehandling</b>	Innefattar p-piller, minipiller, p-spruta, p-stav och all klimakteriebehandling i form av medelpotent eller lågpotent östrogen, inklusive receptfritt östrogen såsom Ovesterin. Innefattar inte hälsokostpreparat och östrogenreceptor-modulerare såsom Nolvadex och Evista
<b>Blödningsrubbnig</b>	Vaginal blödning som avviker från mönster som är normalt för ålder och tillstånd (t.ex. graviditet)
<b>Blödning</b>	Pågående eller påtagligt lättprovocerad blödning från livmoderhalsen vid undersökningen
<b>Avvikande flytning</b>	Flytning som med lukt, konsistens, färg och/eller mängd avviker från det som är normalt för ålder och tillstånd (graviditet, ovulation etc.)
<b>Atrofi</b>	Klinisk bedömning att slemhinnan är påtagligt atrofisk
<b>Typ av TZ</b>	Transformationszon typ 1, 2 eller 3. Se nationellt vårdprogram.
<b>Låggradigt/höggradigt atypiskt</b>	Kolposkopi motsvarar LSIL, resp. HSIL
<b>Swedescore</b>	Scoringsystem för kolposkopi, 0 – 10 p. Se nationellt vårdprogram.